



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

CLAVDII
GALENI
PERGAMENI DE

DIFFERENTIIS

FEBRIVM LI-

BRI DVO,

Laurentio Laurentiano Florenti-
no interprete:

*Accuratè per Simonem Thomam recogniti,
& ex fide Græci exemplaris pene
alijs facti.*

REM MAXIMAM SIBI



PROMITTIT PRUDENTIA

LVGDVNI APVD GV-
LIELMVM ROVILLIVM

M. D. XLVII.

METHODVS

LIBRORVM DVORVM

DE DIFFERENTIIS

FEBRIVM.



GALENVS statim initio designat unde febrium differentia traducantur. Quæ omnino à substantia rei quæ definitione febris explicatur vel accidentibus, & maximè ijs quæ propria sunt & quasi familiaria febri *ἐννοούμενη* inde vocant Philosophi, quia rem ipsam necessariò consequantur, aut certè vt plurimùm ei accidunt: differentias repetit, deinde alijs quæ communia quæque ambigua in hoc & aliud febrium genus incidunt. Quæ posteaquàm breuiter statuit, vexat medicos qui sine arte & methodis logicis diuidant atq; ita rudes cōmentarios tradant sine arte, œconomia, & ordine. Quæ vt plenius intelligantur recurrendum ad præcepta logica in quibus facultas diuidendi cōstitutura. recognoscendum ex Philosophis quid *πλειονασμός, ἑλλειψις, ἀφαίρεσις, παράληψις, πρόσθεσις, ὑπέρβασις*, quæ deniq; vitia & virtutes diuisionis. Iam verò ex Hippocrate plenā febrium diuisionem transcribit. Ex quo in compendium & certas differentias contrahit. Atque hic ad aliud me-

rhodi genus se conuertit Διακριτικόν Plato,
Hippocrates Διαρισμόν & Διασολήν appella-
uit. Ars est quæ iam distinctas species inter
se comparat quid in ijs cōmune & proprium
quid idem & diuersum, quid denique simile
ac dissimile dijudicat. Atque ita partim com-
munibus partim proprijs singularum essen-
tiam constituit & definitione explicat. Rur-
sus constitutas species subalternans καὶ ὑπο-
διαίρεισιν appellatam fecat, atque iterum ad
Διαρισμόν redit, eaque persequitur dum ad
postrema ventū sit differentias quasdam acci-
dentarias seorsum annotat & eorum causas
quæ in febrium naturam incidunt, statæ
periodi fluxionum & similibus. Simpli-
ces quoque febres primū, dein-
de complexas artificiosè
declarat.

INDEX CAPITVM

PRIMI LIBRI.

Quanam sint febrium differentia principales: & quod essentia febrium sit in genere caloris præter naturam. Cap. I.

Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum in humoribus, interdum in partibus animalis solidis, quas Hippocrates continentia nominauit. I I.

Quonam modo febris ephemera, id est diaria, ex causis externis atq; euidentibus præhendat. I I I.

Multas esse causas caloris præter naturam ex quibus gignitur febris, quoties suscipientia corpora promptè se habeant ad continendam diutius caliditatem. I I I I.

Ex putredine accendi febrem cuius causa est obstructio, ac potissimum putrescere quascunque calida atque humida sunt. V.

Pestilentis febris causam esse inspirationem, potissimum quoties corpus in eam dispositionem sit præparatum: quoniam maxima pars generationis morborum est corporis præparatio. VI.

De præcautione, & quonam modo diaria febris ex bubone consistat. VII.

Quod pus optimum sit candidum & crassum & minimè fetidum, & quod optima vrina habeat sedimentum candidum, æquale ac minimè fetidum: et quibus indicis febris diaria cognos-

scatur.

VIII.

Quibus indicij cognosci conueniat febrem putridam, ac de duritie pulsus nonnulla contra Archigenem.

IX.

Quibus indicij febris hectica cognoscatur: et quonam modo consumpto admodum humore cordis, dispositio efficiatur, quam Philippus nominat ex morbo senectam.

X.

De febre hectica: et quod diaria se penumerò: transfat in hecticam, cuius rei indicia multa existunt.

XI.

De indicij communibus cuique hectica, febris: & quam ob causam post ingestum cibum, calorem ipsum augeri contingat.

XII.

Maximum indicium esse febris hectica, quoties arteria ipsa sint quam corpora quæ circiter sunt, calidiores: & quod non oporteat solum circuitionem, sed ipsum februm genus considerare.

XIII.

Quibus indicij febres diaria à se inuicem discrepent: quoniam interdum propter aestum, quandoque ex frigore febris diaria consistit.

XIIII.

INDEX CAPITVM

SECVNDI LIBRI.

DE differentijs febrium ex humorum putredine infestantiũ: vbi refellit opinionẽ ponentiũ omnem febrem putridã fieri ex abundantia bilis. Cap. I

Febrium intermittentiũ tres haberi differentias: quotidianam, tertianam, & quartanam: atq; esse synochon, id est continuam, quam flaua bilis committat. I I.

Quonam modo ex flauabile delata in vniuersum corpus rigor existat: & quod ipsius tertiane accessio, quod longissimum sit, horas duodecim occupet. I I I.

Pituitam refrigerare partes extremas per initia accessionum, difficulterq; accendi calorem minime purum, sed similem fumo, quasi viridioribus accensis lignis. I I I I.

De quartana quæ ex atra bile consistit & quonam modo fieri possit, vt rigor sine febre efficiat. V.

De febre epiala qua simul febricitant ac rigent: ac de humore quem Praxagoras vitreum appellauit, & quonam pituitæ genera sint. V I.

Quot modis conueniat fieri implexus febrium, ex quibus æger minime deducitur ad integritatem. V I I.

Permisceri inuicem febres, scilicet tertianam exquisitam, & quotidianam: & quonam modo

INDEX CAPITVM.

- Agathinus errauit circa semitertianam.* VIII.
- De differentia semitertianæ.* IX.
- Semitertianam esse febrem continuā, nec vnquam deduci ad integritatem, sed errasse Agathinū, vocantem semitertianam omnem febrem diuturniorem.* X.
- Quo pacto erret Agathinus appellans febrem omnem semitertianam, cuius accessio plurimum producat.* XI.
- Quonam modo ex sanguine putrefacto febris accendat biliosa: & quod sanguinis pars tenuior vertatur in flauā bilem, crassior in atrā.* XII.
- Multa morborum genera repetere per circuitionem: vt ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articulare.* XIII.
- Quam ob causam fluxiones certis temporibus decumbant: et quod partes debiliores promptius suscipiant excrementa.* XIII.
- Quonam modo ex calore attrahantur excrementa: & quod dolor omnis irriter fluxiones.* XV.
- Colligi excrementa diuersis temporibus, quæ saepenumero ordinē minimè seruent atq; esse quandoq; breuē, quandoq; longam accessionē.* XVI.
- Quam ob causam accessiones designant ad integritatem.* XVII.
- Quam ob rem febres interdum repetant per circuitionem, interdum continua sint.* XVIII.

INDICIS CAPITVM FINIS

INDEX EORVM QVAE

HIS DVOBVS LIBRIS CON-

tinentur. prior numerus, librum:

secundus, caput in-

dicat.

A

A bitio ⁿ is diariæ in putridam no- ta. 1.9	Accessio ⁿ is ad integritate ^m tem desinentis cau- sa. 2.4 & 2.17
Abitio ⁿ is hec ^t ica in mar corem nota. 1.12	Accessio ⁿ um inaequa- lium causa. 2.16
Abcessus & vrina sunt proportionales. 1.8	Accessio ⁿ is secunda cau- sa. ibid.
Accessio ⁿ is repetentis oc- casio. 2.9	Accessio ⁿ is species. 2.7
Accessio ⁿ is accidetia. 2.7	Accessio ⁿ is tertiana no- ta. ibid.
Accessio ⁿ is sequetis cau- sa. 2.17	Accessio ⁿ um tertiana differentia. 2.3
Accessio equalis quid. I.II	Accessio ⁿ es implexarum februm concurren- tes. 2.7
Accessio ⁿ is equalis di- scrimina. ibidem	Accessio ⁿ um inordina- tarum causa. 2.18
Accessio ⁿ is longioris aut breuioris causa. 2.16	Accidens duplex. 1.1
Accessio pituitosa fe- bris. 2.4	Adenes quid. 2.15
Accessio pituitosa conti- nua. 2.7	Aequalitas febris à pri- mo initio. 1.12
Accessio horrida. 2.8	Aër immoderate calidus ac humidus. 1.6

Affe-

INDEX.

Affectio somno similis.	initia.	2.4
I.11	Bilis exquisita.	I.5
Agentis virtus ac passi- aptitudo.	C	
I.6	Caliditas aliena.	
Alienum qualitate &	2.12	
quantitate.	2.14	Caliditatis aliena causa
Alterationis mora in he-	externa.	2.12
ctica.	I.12	Caliditatis aliena causa
ἀμφοτέρως	2.8	interna.
Analogia. I.1. & I.7. &	Calidum facile corrumpitur.	2.17
I.10. et I.12. et 2.4. et		
2.13. & 2.16. et 2.17	Calor hecticæ.	I.11
Aqua frigida.	I.12	Calor ad se trahit vel fluxionem suscipit.
Arquati.	2.1	2.15
Arquatis superuenit febris.	2.5	Calor attrahit.
2.5	Calor, continue putrescētia depascitur.	I.7
Arquati atrabiles.	2.5	Calor ex suppressione calidi effluuij.
Arteria alijs partibus calidiores.	I.13	I.4
Affatio humorum.	2.16	Calor ex calidi occursu.
Adstrictionem et obstructionem alia febres sequuntur.	I.	4
I.4	Calor ex motu & ebullitione.	I.4
Auctionis caloris causa potissima.	I.4	Caloris febrilis copia sequit copia effluuij.
2.13	Caloris differentia triplex.	I.1
B		
Biliofa & pituifosa	Caloris inaequaliter occurrentis causa.	2.13
discrimen inter		
	Calor	

INDEX.

Calor pulsusq; inaequalis.	I.9	sionis tempore.	2.11
Caloris multiplex generatio.	I.4	Cibaria glutinosa crassaq;.	I.5
Caloris accensio vel augmentum.	2.17	Cibus bonus triplici forma vitatur.	I.4
Calor mordax.	I.9	Cibi mali forma duplex	
Calor mordax inter initia.	I.9	I.	4
Calor primo occurſu mitis, diutius immoranti mordax.	I.11	Cibivitiſi incommoda.	I.4
Calor putris est mordax.	2.	Cibo ingesto post horam calor et velut aquatilis acceſſo.	I.11
	16	Circuitiones ex defluxione fieri.	2.13
Caput variorum morborum causa.	2.14	Circuituum modus.	2.14
Capitis grauedo ob aſtū frequens.	I.14	Circuituum ordine repertentium causa.	2.16
Carbunculi.	2.12	Circuituū ratio, prauentio ſcilicet et cūctatio.	2.7
Carbunculi materis.	I.5	Color ſine flore viuido.	
Καθμειπός.	2.8	I.	II
Causa praegreſſa ephemera.	I.8	Comesa, phagedaene.	2.5
Causa praegreſſa.	I.8.	Concoctionis imbecillae, causa.	I.6
⊕	LII	Concretionis causa.	I.9
Causa praegreſſa quas febres prauenit.	I.9	Cōditione peſtilenti quid agendum.	I.6
Cibandi tēpus indicatur		Congestionis et defluxionis causa.	2.14
acceſſionis et intermiſſionis		Continua in forma quoniam	

INDEX.

- tidiana habens acces* *Densum corpus.* 2.16
sionem mediam. 2.2 *Diaria in putridam abi*
Continuarum febrium *tio.* 1.9
differentie. *ibid.* *Dies caniculares.* 1.6
Continua in forma ter- *Differentie caloris de*
tiana. *ibid.* *materia ducta pro-*
Continentia, contenta, *prussima.* 1.1
& impetum facien- *Differentie caloris ab*
tia. 1.2 *intensione.* *ibid.*
Contagiosi morbi. 1.3 *Diffflationis forma du-*
Continua ex flava bile *plex.* 1.4
duplex: synocha & *Diffflatio.* 2.17
continua. 2.2 *Dispositio permanens in*
Contractionis pulsus ve *parte affecta.* *ibid.*
locitas. 1.9 *Dispositio partis affe-*
Corpus rarum. 2.16 *cta duplex, debili-*
Corpus densum. *ibid.* *tas, & excremen-*
Corporis preparatio bo *tum.* 2.18
nam partem actio- *Dolor attrahit.* 2.15
nis sibi vendicat. 1.6 *Duarum continuarum*
Cutis tactu sicca & qua *pituuitosa et tertiana*
si bursa. 1.11 *implexio tertia.* 2.10

D

D *Ebilitas recipien* 1.9
tium. 2.15 *Duritiei arteriatu cau-*
Decursus humorum du- *sa.* *ibid.*
plex causa. *ibid.*

E

Defluxiones ex cerebro. 2.14 **E** *Fluvium vaporoso*
sum & mor-
dax.

INDEX.

- dæx. 1.4 Excrementa quare ea-
 Effluuium mordax qui dem permanent.
 bus excernitur. ibid. ibidem.
 Empirici & rationalis Excrementa cur decum-
 differentia. 1.3 bunt in partes alias.
 Epacmaſtica febris. 2.2 ibidem
 Ephemera fit ſanguine calefacto. 2.12 Excrementa cur nō mit-
 tuntur. 2.17
 Ephemera propter æ- Excrementoſa corpora.
 ſtum nota. 1.14 2.15
 Ephemera propter æ- Excrementi cauſa. 2.14
 ſtum & frigus diſfe- Excretio cita. 2.16
 rentia. ibid. Excretio tarda. ibid.
 Ephemera propter a- Exiguitas febris. 1.12
 ſtriſtionē nota. ibi. Ex labore febris. 1.4
 Ephemera & putrida Ex morbo ſenectæ. 1.10
 febris diſcrimen. 1.7 Expultricis facultatis
 Epiala cauſa. 2.6 incitamenta. 2.16
 Epidemiorum morbo - Exquiſita tertiana. 2.3
 rum precautions. Exquiſita tertiana, e-
 1.7 iusq; nota. 2.11
 Error in victus ratio- Exquiſita ſemitertiana.
 ne. 2.18 2.8
 Eryſipelas. 2.5 Extenuantia, acriaq;
 Excrementum deſluens 1.5
 duplex. 2.16 F
 Excrementorum reli- F Acilè permutabi-
 quia pauca, interdū lia 1.2
 nulla. ibid. Facile & diſſicilè pati-
 bilia.

INDEX.

<i>Bilia.</i>	I.6	<i>Febris ex lassitudine.</i>	I.4
<i>Febricitantes ex cruditate.</i>	I.4	<i>Febris ex cōgestiōe.</i>	2.17
<i>Febricitare parati.</i>	ibid.	<i>Febris ex mœrore.</i>	I.4
<i>Febris ardentis in hectica abitionis causa.</i>	I.12	<i>Febris ex sanguine est ceteris simplicior.</i>	2.12
<i>Februm causæ vniuersales.</i>	I.4	<i>Febris ex sanguine circuitio.</i>	I.12
<i>Februm differentia duplex.</i>	I.1	<i>Febris ex sanguine mitior.</i>	2.12
<i>Februm differentia principalis.</i>	ibid.	<i>Febris ex flaua bile indiciū.</i>	2.3
<i>Febris diuiso.</i>	ibid.	<i>Febris epiala causa.</i>	2.6
<i>Febris triplex.</i>	ibid.	<i>Februm generatio & causa prægressa.</i>	I.3
<i>Februm essentia.</i>	ibid.	<i>Februm genera se consequio trahunt.</i>	1.2
<i>Febris ephemera genera triplex.</i>	I.7	<i>Febris hectica.</i>	I.9
<i>Febris ephemera indicia.</i>	I.8	<i>Febris intemperies est calida.</i>	I.3
<i>Febris epiala.</i>	2.6	<i>Februm intermittentiū & continuarum discrimen.</i>	2.1
<i>Febris æqualiter affligentis, increscentis, & decrescantis causa.</i>	2.18	<i>Februm intermittentiū species & differentia.</i>	2.2
<i>Febris ex bubone duplex: ephemera, & putrida.</i>	I.7	<i>Febris marasmodes.</i>	I.10
<i>Febris ex inflāmatione.</i>	I.5	<i>Febris marasmodes calida est & sicca.</i>	
		<i>ibidem</i>	

Febris

INDEX.

Febris ob inflammatio- nem fluxionis. 2.15	Febres simplices, compo- tarum sunt regula. 2.
Febrium ordo. 1.2	2.2 & 2. 10
Febris pestilens interdū ab humore, frequen- tius ab aëre putrido. 1.	Febris solitudinis difficilis. 2.5 Febrium species ex humo- re. 2.10
Febris pituitosa signum. 2.	Febris tertiana & quo- tidiana duplex. 2.6
Febres putride. 1.9	Febris tertiana materia. 2. 1
Febris parvæ reliquæ. 2.	Febris vt ephemera in se- cundū diē extēta. 1.11
Febris quartana. 2.1	Febris tertiana quibus accidit. 2.1
Febris quartana mate- ria. 1.2	Fluxio. 2.14
Febris quartana quibus accidit. 2.1	Fluxionū causa duplex. 2. 15
Febris quintana an vlla sit. 1.7	Fluxionis maioris cau- sa. 2.15
Febris quotidiana. 2.8	Fortitudo mittentium. 2.15
Febris quotidiana mate- ria. 2.1	Frequētia pulsus per ex- teriorem quietem. 1.9
Febris quotidiana qui- bus accidit. 2.1	Frons sicca intentaq;. 1.11
Febris ratione societatis. 1.	G
Febris sedes, est cor. 1.4	Generationis excre- mentorum duplex ratio. 2.17
Febris semitertianæ pul- chra historia. 2.8	Glutinosa, frigida, cras- saq;. 2.16

Grædo

INDEX.

Grauedo in febre & de	& I. II. & I. 12
fluxio.	I. 14 Hectica cum marcore
H	indicia. I. I
Hectica.	I. 9 Hectica perfecta nota.
Hectica fit duo-	I. II
bus modis.	I. 10 Hectica tabifica obno-
Hectica ab initio pra-	xia. I. 12
hendens.	ibid. Hectica febris maximū
Hectica periculo pro-	signum. I. 13
pior.	I. II Hectica ab alijs haben-
Hectica spei propior.	tibus aequalem ac-
ibidem	cessionem differentia
Hectica ambigens. ibid.	I. I
Hectica incipiens sola.	Hectica & cōtinue dif-
ibidem	ferentia. I. II
Hectica triplex.	ibid. Hecticarum febrium cō
Hectica curabilis. I. 10	munia. I. 12
Hectica difficilis.	I. II Hemigrana. 2. 13
Hectica generatio. ibid.	Herpetes. 2. 5
Hectica media.	ibid. Homotonos. 2. 2
Hectica citra marco-	Horrida febris quid.
rem.	ibid. 2. 9
Hectica non habet acces-	Horrida accessio. 2. 10
sionem sed alteratio-	Horrida febris. ibid.
nē huic similem. I. 12	Horror, rigoris frigo-
Hectica febris putrida	risq; medius. 2. 8
implexa. I. II. & I. 13	Horror. I. 9. & 2. 9
Hectica occasiones. I. 12	Humidi cōsumptio. I. II
Hectica principium. I. 9	Humiditatem ebulli-
	t. o.

INDEX.

- tio. *ibid.* Implexus febrium cau-
 Humidus calor magis *sa.* 2.17
 sentitur. *ibid.* Impotētia vigilādi. 1.11
 Humor committens fe- In acceſſione longitudi-
 brem ex caloris qua nis cauſe. 2.5
 litate deprehenditur. Inclination accēſſionis
 2.12 quideſt. 2.17
 Humor cunctim putre- Inclinationis cauſa. 2.16
 ſcens. 1.7 Inclination non deſinens
 Humor incenſioni pro- ad integritatem. 1.9
 penſus. 2.4 Incrementum accēſſionis
 Humor melancholicus. quid. 2.17
 2.12 Incrementum ſemiter-
 Humorum aſſatio. 2.16 tiane. 2.9
 Humorum reliquia. *ibi.* Incrementū equale. 1.8
 Humorum vitium. 2.14 Inflammatio. 1.5
 Humorum permutatio. Infarctio. 2.17
 2.18 Ingeminationes. 2.10
 I Initij accēſſionis ſignū.
 I Ignis ſacer, ſeu eryſipe 2.8
 las 1.3. & 2.5 Initium accēſſionis quid
 Ignorantia cauſa. 1.3 2.17
 Ignorantium medicorū Initium pituitosa ſim-
 genus duplex. *ibid.* plicis. 2.4
 Illa in thoracem retra- Intermiſſionis tertiane
 cta. 1.11 tempus. 2.3
 Impatibiles ab aëre pe- Intermiſſio pituitosa.
 ſtilentī. 1.6 2.4
 Implexus quid. 2.10 Intermiſſio pituitosa de
 B terior

INDEX.

- terior. 2.4
 Iræ calor quando fit fe-
 bris. 1.4
L
 Libri Galeni de pul-
 sibus. 1.9
 Lippitudo arida. 1.11
 Logica vsus. 1.3
M
 Arcor. 1.10
 Marcor post ar-
 dentem febrem. ibid.
 Marcor incurabilis. 1.11
 Media hæctica. 1.8
 Medici officium. 1.7
 Melancholicarum febrium
 implexus. 2.11
 Menstrua. 2.18
 Morbi per circuitum re-
 petentes. 2.13
 Morbi solutio. 2.16
 Morborum circuitione
 & sine circuitione in-
 festantium differen-
 tia. 2.18
 Mors sine morore. 1.10
N
 Non insignis muta-
 tio in febre. 1.11
O
 Bstructio. 1.5
 Oculi ac aures cir-
 cuitione laborantes. 2.16
 Oculi concaui. 1.11
 Oculorum fluxiones ex
 capite sunt. 2.14
 Ophthalmia. 2.13
 Ophthalmia per circui-
 tum repetens. 2.16
P
 Alpebrarum ossa pro-
 minentia. 1.11
 Partes debiliores. 2.14
 Pars excrementis abun-
 dans aut vacans. 2.15
 Partis suscipientis at-
 tractio. ibid.
 Partis suscipientis imbe-
 cillitas. ibid.
 Paracmastica febris. 2.2
 Peripneumonia. 2.16
 Pestilenti conditione quid
 agendum. 1.6
 Phagedæna. 2.5
 Phrenitis. 2.16
 Phlegma acidum. 2.6
 Phlegma dulce. ibid.
 Phlegma salsum. ibid.
 Phlegma

INDEX.

- Phlegma vitreum. *ibid.* Pulsus arctior quid est.
 Pituita vitrea. *ibid.* *ibidem*
 Pituita otiosa. 2.9 Pulsus durus. *ibid.*
 Pituita quid. 2.6 Pulsus primâ die durus.
 Pituita species. *ibid.* *ibidem*
 Pituita tres differentie. Pulsus duri & debilis
ibidem cause. 1.12
 Pituitosa inclinatio. 2.4 Pulsus & calor æquabi
 Pituitosa simplex. *ibid.* *lis.* 1.8
 Pituitosa continua sim- Pulsus in febre putrida
 plex & permixta. 2.7 durus. 1.9
 Plenitudo ad vires. 1.5 Pulsus hectica. 1.11
 Plethora. 2.14 Pulsus pituitosa. 2.4
 Pleuritis. 2.12. & 2.16 Pus optimum. 1.8
 Podagra. 2.13 Pus multiforme. *ibid.*
 Post inclinationē cum Pus superate naturâ. 1.7
 suavi vapore integri Pure hectica idicia. 1.21
 tas. 1.8 Puris & putredinis di-
 Precautio. 1.7 scrimina. 1.7
 Presagiendi modus. 2.7 Putredinis cause. 2.12
 Principiū hectica. 1.12 Putredinis simplicis cau-
 Pulsus magna citaq; di- sa. 1.7
 ductio. 1.8 Putredinis aeris princi-
 Pulsus cōtractio in febre pia. 1.6
 nihilo cōcitatio. 1.8 Putredo accendit calo-
 Pulsus parvi inæqua- rem. 2.15
 lisq; causa. 1.9 Putredo triplex. 1.7
 Pulsus i diaria dur^o. *ibi.* Putrefactio. 2.17
 Pulsus inæqualis. *ibid.* Putrefactio obnoxia. 1.5

INDEX.

- Putrefactionis humorū. re. *ibid.*
 modus. 2.5 Quotidiane materia.
 Putrefactionis sanguinis causa duplex. 2.12 2.1
 & 2.16 R
 Putrefactionis cause. 2.12 R Ationalis utitur
 Putredo concoctione per & ratione &
 mixta. 1.7 experimento. 1.3
 Putridi humores in cor quid. 1.9
 pore. 2.13 Rigor ex pituita dul-
 Putridum expirantes. 1.3 ci. 2.6
 Rigoris circuitus. 2.5
 Q Vartana febris. Rigor tertiana et quar-
 2.1 tana discrimen. 2.1
 Quartanarum Rigor inter initia. 1.9
 rigor. 2.5 Rigor sine febre. 2.6
 Quartane materia. 2.1 Rigoris in febre tertia-
 Quartana obnoxij. 2.5 na causa. *ibid.*
 Quartana exquisita cau Robur. 2.16
 sa & intermissio. 2.5 S
 Quartana accessio. *ibi.* Sanatio febris quādo
 Questio an omnis febris subsequitur. 2.18
 sit putrida. 1.7 Sanguis an cōmittat fe-
 Quintana febris. *ibid.* brem putridam. 2.12
 Quotidiana continua. Sanguinis mutatio in
 2.8 alios humores. *ibid.*
 Quotidiana simpliciter Sanguis cū excrementis
 quid. *ibid.* putrescit. 2.15
 Quotidiana cum frigo Sanguis excremento-
 sus.

INDEX.

<i>fus.</i>	2.16	<i>mixtione aequali ini-</i>	
<i>Sanguis putrefit.</i>	2.12	<i>tium.</i>	2.9
<i>Sanguis semiputris.</i>	2.16	<i>Serpentia siue herpes.</i>	
<i>Sanies per tussim reie-</i>	2.5		
<i>Etia in pleuritide quid</i>		<i>Siccitas cui hectica pro-</i>	
<i>indicet.</i>	2.12	<i>pria sit.</i>	1.12
<i>Satietais morbi.</i>	1.4	<i>Siccitatis cause.</i>	1.9
<i>Semitertiana.</i>	2.2	<i>Siccitatis hectica ma-</i>	
<i>Semitertiana cum hor-</i>		<i>rasmodis argumen-</i>	
<i>rore incipit.</i>	2.8	<i>ta.</i>	1.12
<i>Semitertiana denomina</i>		<i>Similariū exarsio.</i>	1.11
<i>tio.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Sitis.</i>	1.14
<i>Semitertiana febris quæ</i>		<i>Species febris desinentē</i>	
<i>dicenda sit.</i>	2.10	<i>indicat.</i>	2.7
<i>Semitertiana permixtio</i>		<i>Squalida dispositio.</i>	1.11
<i>triplex.</i>	2.9	<i>Squaliditas.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Semitertiana est conti-</i>		<i>Subsistentia puri pro-</i>	
<i>nua.</i>	2.10	<i>portionabilis.</i>	1.7
<i>Semitertiana exquisita.</i>		<i>Suavis calor.</i>	1.8
2.8. & 2.9.		<i>Symptomatu pugna.</i>	2.9
<i>Semitertiane exquisite</i>		T	
<i>accessio.</i>	2.9	<i>Emperamentum</i>	
<i>Semitertiana magis bi-</i>		<i>quid.</i>	2.10
<i>liosæ.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Tempora collapsa.</i>	1.11
<i>Semitertiana magis pi-</i>		<i>Tempus collectionis ex-</i>	
<i>tuitosa.</i>	<i>ibid.</i>	<i>crementi.</i>	2.16
<i>Semitertiane modus du-</i>		<i>Tensionis cause.</i>	1.9
<i>plex.</i>	2.8	<i>Tertiana admodum pro-</i>	
<i>Semitertiane ex per-</i>		<i>ducta.</i>	2.12

INDEX.

Tertiana continua finitima.	2.2	Tertiana quotidiana confusa.	ibid.
Tertiana cum quotidiana na implexa hystorica.	2.8	Tertiana simpliciter vel tertiana intermittens.	2.8
Tertiana cū quotidiana cōtinue permixtio triplex.	2.9	Tertio die inedia.	1.11
		Totū ossa & cutis.	ibid.
		Triū febriū implex ⁹ .	2.2
		V	
Tertiana continue & quotidiana intermit		Vigor accessions quid.	2.17
tentis implexio quarta.	2.10	Vigor mitior.	1.8
Tertiana cū rigore.	2.8	Viscerum inflammatio-	
Tertiana & quotidiana ne implexio secunda.	2.10	nes.	1.12
Tertiana & quotidiana ne implexus quatuor.	2.6	Vigor semitertiane.	2.9
		Vires naturales quatuor.	2.14
		Vires exolute.	2.16
		Vrina cruditas aut obtusura concoctio.	1.9
		Vrina est cruditatis concoctionisq; potissimum indicium in febre.	2.7
		Vrina statim concocta.	
		I	
		INDICIS	
		FINIS.	

CL. GAL. PER
 GAMENI DE DIFFE-
 RENTIIS FEBRIVM
 LIBER PRIMVS,
 INTERPRETE LAV-
 RENTIO LAVRENTIA-
 NO FLORENTINO.

*

*Quenam sint febrium differentie principa-
 les, & quod essentia febrium sit in genere calo-
 ris præter naturam.* CAP. I.

DIFFERENTIAE febrium, maxi *Febrium*
 mè quidem propriæ ac principa- *differe-*
 les, secundum earum substantiam *tia du-*
 sunt: aliæ verò secundum aliquod *plex.*
accidens. Quoniam verò & ipsorum acciden *Accidens*
 tiū non vna est natura, sed alia quidē propin *duplex.*
 quiora, magisq; propria diuidendę substantiæ
 sunt, alia verò remotiora ac magis aliena: id-
 circo & earum quæ hinc sumuntur differen-
 tiarum minimè vnum genus est. Itaque ma-
 ximè quidem peccant, quicunque differētiis
 proprias ac maximè principales omittunt.
 Deinde verò, quicunque mentione harum fa-
 cta permiscēt cum eis differentias acciden-
 tales æqualiter omnes, minimè discernentes

B 4 utiles

πλεονασμός in explicandis differentiis intelligitur non solum quia extra naturam rei, quæ diuiditur excurrit diuisor, sed

quia plu vtiles ab inutilibus. Non solum autem peccates enu- carunt plerique medicorum in ipsis differen- merat q̃tiarum generibus, aut plures quàm oporteret institutu tradendo, vt inutilium quoque meminerint: in præsen aut pauciores, vt nonnullas etiam vtiles omi tia requi ferint: sed etiam diuidēdo genera ipsa in pro rat. hæc prias differentias, similiter errarunt. Ne lon- enim ita gius abeas, quum primū ac maximē pro- tractat prium differentiarum genus, ab ipsa diuiden ars vt dæ rei substantia sumatur, videas tamen nō- aliquid nullos medicos prætermisisse vniuersum hoc pruden- genus, alios verō diuidēdo plura quàm opus tia et cō- esset statuisse, aut in primis substituisse. tamen si filio re- Hippocrates optimē fecerit diuisionem li- lingua- bro sexto Epidemion. Dicitio autē habet in tur. hunc modum: Febres, hæc quidem manu sunt

Explica- mordaces, illæ verō mites: quædam autem tio dictio non mordaces, sed incrementales: nonnullæ nis repe- acutæ, sed ab ipsa manu deuietæ: quædā sta- tenda ex tim ardentes: quædam verō semper debiles, commen- ficcæ: aliæ salæ, aliæ † inflatæ, aspectu gra- Galen. in ues,

6. epid. I. vbi multum alia explicantur, tum hoc verbū πλεονασμός, at in exegesi vocum Hippocratis breuius ἔτοις νεῖδι & μισοὶ καὶ ὑγρότητι & ἢ καὶ πνεύματι ὡδὲς, in quibus scilicet magna vis humiditatis & flatuum est.

ues, aliæ ad manum humide, aliæ rubicundæ
 valde, aliæ liuidæ, aliæ præpallidæ, & alia
 istiusmodi. Apertissimè enim hoc loco ab
 ipsa rei substantia, simulq; ab ipsa dignotio-
 ne in proprias differentias fecit diuisionem.
 Nam essentia quidem febrium est in genere
 caloris præter naturam. Differentiæ verò ca-
 loris, & ex eo quòd maioris minorisque ra-
 tionem admittat, sumuntur, & ab ipsa mate-
 ria in qua calor ille præter naturam existit,
 & ab ipso mouendi modo: quas omnes com-
 plicans, cum dignoscendarum earum ratio-
 ne scripsit, quemadmodum procedente ser-
 mone docebimus. Porro autem quæ à maio-
 ris minorisque ratione ducuntur, sunt mani-
 festæ: & in hoc genere differentiæ, medicis
 mos est magnam ac paruam febrem nomina-
 re, verùm improprie quidem de rei qualita-
 te quantitatis vocabulum enunciant. sed ita
 facere consueuerunt, non in febre solùm, sed
 in alijs sexcentis, quæ in qualitate quidē ipsa
 essentiam habent, cæterum magna paruaque
 nominantur. Quæ verò differentiæ à mate-
 ria sumuntur, in qua calor ille præter naturā
 consistit, maximè propriæ caloris præter na-
 turam differentiæ sunt: siue corpus ipsum cor-
 dis præhenderit, siue humores conditos in
 ipsius ventriculis. Reliqua autem ac tertia dif-
 ferentia est, vbi aërea substantia sola admo-
 dum

*Differen-
 tiæ à ma-
 teria da-
 ctæ ma-
 ximè p-
 pria.*

*Analo-
gia.*

dum incaluit, humida verò ac solida corpora adhuc quidem incalescunt, sed nondum incaluerunt. Non enim parum differt, incallescere aliquid dicas, an incaluisse. Sed discas evidentissimè, id quod dicitur, ex his exemplis. Finge aquam calidam inditam leberi frigido, deinde ab ea ipsa aqua calefieri contra tu ipsius leberis corpus, nondum autem totum exquisitè incaluisse. & rursus finge in calidum atque ignitum leberem frigidam aquam inditam, deinde calefieri quidem adhuc, nondum autem incaluisse. Ex his exemplis, cum secundo quidem prima febrium differentia similitudinem habet, quas corpus ipsum cordis præhendisse docuimus: cum primo autè, secunda, quas conditos in ventriculis humores occupasse diximus. Reliqua autem ac tertia differentia exemplum omnino simile non habet: sed claritatis causa, finge fabrilem follem trahere ad se aërem admodum calidum; deinde calefieri adhuc ab eo, nondum autem incaluisse. Sed exemplum magis indicabit rei declarandæ naturam, si fixeris, in folle contineri humorem: atque adhuc magis, si foramina folli per quæ trahit atque emittit aërem, ita angusta effeceris, ut humori quidem inuia, aëri verò peruia sint. Qua sanè in re potissimum dissident naturæ opera ab his quæ homines ipsi efficiunt. Etenim sub-

stantia

stantia aërea permixta cum sanguine est in omnibus arterijs, per multa foramina pariter spirantibus: ac nihilominus in ipso corde, ut quæ per eas omnes confluat.

Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum in humoribus, interdum in partibus animalis solidis, quas Hippocrates continetia nominavit.

Febrium ordo.

† ἐπιπνευµατικῶν

CAP. II.

HIC ergo calor præter naturam, quæ pascit & appellamus febrem: alias ex alio de quasi ser prædictis incipit. † Occupat autem pit trāsī ac simul afficit cum eo quod affectū litq; ē spī est, reliqua duo genera Facillimè ergo calor ritib⁹ ad ex humoribus ad spiritum transineat: humores humores res autem tardiùs ignem concipiunt à succē & cōtrā so spiritu: atque etiam solidum corpus prō atq; hinc ptius tribuit calorē humoribus aëriæq; sub etiā soliditantiæ, quàm ipsum ab illis accipiat. omnis dum cor enim substantia tenuis faciliùs quàm crassa pus per alteratur. Tenuissimus autem aër, crassissima uadit. autem corpora solida sunt: humores medio Facile p genere ambigūt. Nec quicquàm refert præsen mutabi ti loco, spiritum vel aërem appellare. nam de lia. his alibi fusiùs diffinitū iam est. Nunc verò, Cōtinen sufficiet illud tantūmodo scire, quod (puto) tia, con Hippocrates indicās dixit, Continētia, ac cō tenta, & tenta, & impetū facientia. Continētia quidē impetum appellans, ipsas corporis partes solidas: con faciētia. tenta

Februum genera se cōsequio trahunt. tenta autem, humores: impetum verò facientia, spiritus. Febrilis enim dispositio aliàs ex alio de prædictis incipit: verum in eo genere quod primum affectum est minimè pertranet, sed occupat reliqua duo: ac nisi priùs solvatur, processu temporis illa similiter afficit, atque hæc summa sermonis est. Sed oportet ea quæ dicta sunt, demonstrare, notasque vniuscuiusque generis febrium percurrere. Statim itaque de generatione earum dicere aliquid opus est.

Quonam modo febris ephemera, id est, diaria ex causis primitiuis atque euidentibus præhædat, qualis empiricorum qualis rationaliū via sit ad inuentionem, quæ quoniam partim experientia partim ratione perficiatur, sine methodis logicis esse non potest. Ex suppositione paulatim ad genus febrium descendit, & hoc ex materia diuidit.

CAP. III.

Februi generationis & causæ prægressus.

EX lassitudine ergo, ira, mœrore, vitiis, frigore, insomnio, cruditate, temulentia, ac satietate, quosdam febricitare cunctis hominibus perspicuum est, ab ipsa rei euidentia edoctis. Quinetiam pestilentem aëris conditionem afferre febrem, minimè ignorant, quicumque intellectu participant: quemadmodum & versari cum his qui peste laborant, periculosum esse.

Affici

Affici enim periculum est, quasi à scabie qua-
 dam aut ophthalmia. Periculosum prætereà *Cōtagio*
 est, consuescere his qui tabe tenentur, atque *si morbi.*
 in totum cum omnibus qui putridum adeò
 expirant, vt domicilia in quibus decumbunt, *Putridū*
 grauitèr oleant. Constat prætereà ex longo *expiran*
 rerum vsu, vt qui consuetudinem exercita- *tes.*
 tionis omiserint, vt alijs multis morbis, ita
 nihilominus febrilibus corripiantur. Et item,
 vt quæ vocatur plethora generet febres, atq;
 etiam prauis cibi, ac medicamenta, & æstus
 circa Canis syderis ortum: & alia huiusmodi
 cunctis hominibus (vt ita dixerim) perspicuū
 est. Quæ verò ab ipsis in corporibus nostris
 fiat affectio ex qua febricitamus, minimè
 sciunt, neque plerique hominum, neque qui-
 dem medicorum. Duplex autem genus igno- *Ignoran*
 rantium talia est: alterum quidem, quòd ipsa *tium ge-*
 experientia tantummodò nititur, tanquam *nus du-*
 nulla rei cuiusquàm natura, ratiōe possit in- *plex.*
 uestigari. Alterum autem genus est eorū: qui
 sapientes quidem videntur, sed cum ignorēt
 æquè quàm priores, scientiæ tamen habent *Ignoran*
 existimationem. Ignorare autem eos contrin- *tia cau-*
 git, quia nullam habent in methodis logicis *sa.*
 exercitationem, ex quibus cognoscuntur ac *Logica-*
 discernuntur à demonstratiuis sumptionibus *rum me-*
 verisimilia quidem, sed quæ nihil veri aut in- *thodariū*
 uenire aut demonstrare possunt. Huic *vsus.*
inici-

inscitiae insolentia accessit, ob quam nonnulli ex eis in tantam audaciam atque amentiam deueniunt, ut nec ea quae omnes homines cognoscunt, experientiam ipsa edocui, febrium causas esse concedant. De quibus cum libro de causis procatarteticis abunde docuerim, nihil opus est hoc loco mentionem facere temerariae loquacitatis coram. Neque enim contradicere, neque soluere sophismata hoc libro institui: sed instituire ac docere, subiijciendo ea quae alibi a nobis sunt demonstrata, ac docendo differentias febrium. Subiijciunt ergo, caliditatem, frigiditatem, siccitatem, atque humiditatem esse elementa corporum, ac fieri primas agnitudines ex intemperie horum, e quibus una febris existit, quoties calor quidam praeter naturam in corde extiterit. Differentiae autem secundum genus caloris, de quibus praesens sermo tractat, ab ipsa materierum genere triplicium differentia ducuntur, suscipientium tigneam caliditatem. Aut enim in ipso corpore cordis, aut in humoribus prima ipsa acceditur, ut dicebamus, aut in spiritu. Praeueniunt autem omnium febrium constitutionem nonnullae causae omnibus manifestae, de quibus paulo antea docuimus, ex quarum observatione empiricus quidem medicus ad curationem nonnihil iuuatur. Rationalis vero ad ipsam rei naturam accedens, per indicationes ab illa futurorum.

*Postulat-
tum.*

*Febris in
temperies
est cali-
da.*

*† παρ-
τασιν. i.
febrile.*

*Empiri-
ci & ra-
tionalis
differen-
tia.*

turorum.

turorum præfensionem atque inuentionem curationis, iuuatur: vtens omnibus quidē experientiā ipsa inuentis, adiiciens autem ipsis multa ex docēdi via rationali. Quæ ergo sint per vtrāque partem inuenta (experimentum *Rationa-* intelligo ac rationem) alio loco docuimus. *lis vtrū*
 Quæ verò dispositio ab vnaquaque causa *& ratio* procatarctica in corpore consistat accendēs *ne & ex* febrem, nunc docere instituiamus. *perimen*

*Multas esse causas caloris præter naturam, 10.
 ex quibus gignitur febris, quoties suscipientia
 corpora promptè se habeant ad continendam
 diutius caliditatem.*

CAP. IIII.

CVM ergo videamus non vnum modum, neque generationis, neque actionis caliditatis (quando ne ipsius quidē ignis modus vnus est) sed gignitur aut propter motum, aut propter putrefactionem, aut quia alteri caliditati cōiungitur, aut propter suppressionē calidi effluuij, aut propter permixtionem calidæ substantiæ, *Caloris* tanquā de fonte quodam ebullientis aut *multi-* genitæ, scilicet ad nostrum sensum, aut augētis caliditatem: necesse est omnes febriū *plex ge-* causas in prædictos modos reuocari: qualis si *neratio.* fuerit ætus est, siue ex ipso sole actio talem habeat appellationem, siue affectio quæ in corpore efficitur, siue ea quæ iam effecta est. Nā *Febrium* *causæ v-* *niuersa-* *les. Aest?*
 & ca

Febris & ea ipsa calor est præter naturam: nondum
sedes est tamen febris, nisi cor ipsum concalescerit.
cor. Sanè totum hoc genus causæ ex consuetudi
Calorex ne efficitur rei calefaciētis, siue sol, siue ignis,
calidi oc siue medicamentum fuerit id quod calefacit,
curfu. extrinsecus quum aut attingit, aut propiùs
Calorex accedit aut consuefcit, vel quouis alio mo-
motu & do libeat appellare. At verò ira quasi ebulli-
ebullitio tio quædam ac motus vehemens est irascibi-
ne. lis facultatis quæ in ipso corpore cordis se-
Ira ca- dem habet. Concalescit autem interdum cū
lor quã- ea spiritus, atque interdum sanguis. & si prō-
do fit fe- ptè se habeant suscipientia corpora ad con-
bris. tinendum diutiùs caliditatem: quamuis ip-
 sius cordis motus destiterit, hæc permanent
 calida præter naturam, tuncque febricitare
 hominem necesse est. Hæc ergo febris princi-
 pium habet, motum atque ebullitionem na-
Febris ex tiuæ caliditatis. Febris autem quæ ex mœro-
mœrore. re consistit, non etiam ebullitionem, sed mo-
 tum tantummodò principium habet. Si au-
Ex lasi tem ex lassitudine efficiatur, principium qui-
tudine. dem habet motum ampliorem musculorum,
 ac neruorum, & ligamentorum, & articulo-
Calorex rum, quæ quidem prima calefiunt: calor au-
suppres- tem continenter cordi distribuitur, ac tunc
sione ca- febricitant. Vbi verò febris propter densita-
lidi efflu tem cutis accenditur, qualis maximè astrictis
uij. refrigeratisque fieri solet: collecto in corpo-
 re mor-

re mordaci effluuio cōsistit. Diffilantur enim *Difflatio*
semper animalium corpora duobus modis, *ns for-*
emissis foras quotidie vaporosis, fumosisque *ma du-*
excrementis: attracta autem intrò aërea sub- *plex.*

stantia refrigerante, atque ventilante natu-
ralem caliditatē. Vbi igitur fortis causa con- *Effluuiū*
densando curem prædictos meatus astringat, *vaporo-*
sæpe plethoram inducit, quoties vaporosa ac *sum &*
benigna materia affluit: interdū febrem com- *mordax*
mittit, quoties acris ac mordax fuerit. Id quē *Auctōis*
maximē quum ex eo augetur calor, quia re- *caloris*
frigerans aer intra corpus non trahitur. Ex- *causa po-*
cernitur autem excrementū acre ac mordax *tissima.*
aut ijs qui sunt naturā malis humoribus ple- *Effluuiū*
ni, aut ijs qui malos cibos ingesserūt, aut sæpe *mordax*
non benē concoxerunt. præsertimq; ijs qui *quib' ex-*
præterquam qd ci bis dictis vescuntur, etiam *cernit.*
limosam, aut lutosam, aut coenosam, aut pa-
lustrēm, aut stagnantem, aut alio quouis mo-
do corruptam & putrefactā aquam bibunt.

Eodē modo euenit, vbi immoderatē laborēt, † *† q̄pov-*
aut vigilēt, aut † angore afficiantur, aut acris *n' s̄ci.*
medicamenta frequenter ingesserint. Cibos
autem malos intelligo, & qui ex natura tales *Cibi ma-*
sunt, vt allia, cæpe, nasturtiū, porrū, brassica, *li forma-*
ocymum, vrtica: & alij quicunque nominan- *duplex.*
tur agrestes, vt lapsanæ apud nos: atque etiam
qui boni sunt ex natura, sed ob putredinem
quandam prædictis æquale, aut maius sæpe-

tur atque efficitur benignum.) Quemadmo-
 dum & ijs qui motus fortiores iustinuerint, *ventri-*
 aut in sole æstiuo steterint, aut in balneum *culo*, ea
 calidum dulcium aquarum descenderint, cibi enim for-
 corrupti in vniuersum corporis habitū trans- *mula di-*
 sumuntur: sic eos quibus corrupta cibaria *cendi* &
 deorsum deferuntur, febris minimè sequitur *plū yest*
 nisi propter aliquam aliā causam: vt si saepe- *pa, ma-*
 numero surgendo in lassitudine inciderint, *gis vētri*
 aut ventrem ipsum inflammatio tentauerit. *culus q̄*
qua vici

Ex putredine accendi febrem, cuius causa na *ven-*
 est obstructio: ac patissimum putrescere, qua- *triculo*
 cunque calida atque humida sunt. *intelligi*

CAPVT

V.

tur qua-

CAeterum si mearus obstruantur ac- *quam*
 que humores stipentur (nam de ea *vicina.*
 re docere distuli) animalia putridis *Obstru-*
 febribus tentantur. Promptissimè *ctio.*

enim putrescunt, quæcunque calida & hu- *Putrefa*
 mida, & multa sunt in locis calidis, nisi dif- *ctioni ob*
 flentur ac refrigerentur. Ergo neque mirum *noxia.*
 videri debet, quamobrem febres sequantur *Plenitu-*
 plerhorā: quoniā per eiusmodi dispositiones *do ad vī*
 multæ obstructions efficiūtur, ac totū cor- *res.*
 pus difficulter diffilatur. Igitur ex plenitudine
 quæ est ad ipsas vires, humores ipsi citò cor-
 rumpuntur, neq; cuncti, neq; cōcocti, pbe: quip-
 pe q̄ vires cōficientes eos, debiliores existāt.

Quocirca quæcunque cibaria glutinosa crassaque sunt, morbos cōmittere magis possunt. obstruere enim atq; stipare humorem ex illis facilius est. Sed nonne contrarias scilicet extenuantia & acria, morbos committere possunt: Videntur enim qui alterutro victus genere frequentius vtuntur, febre similiter prehendi: quia hæc omnia (vt antè diximus) malos humores gignere assolent. Hæc ergo, ratione ea quòd malos humores gignunt, febriū causa sunt: alia verò ratione putredinis, quæcunque glutinosa, crassaque existunt. Nec secus partes inflammatione affectæ ratione putredinis accendūt febrem. Impactus enim in eas qui influxit humor, vbi fuerit naturā calidus, quia non benè diffatur, putrescit. Vbi igitur † decurrens humor fuerit planè biliosus, caliditas † sacro igni subsimilis occupat partem. vbi sanguineus † inflammationi subsimilis, ex amobus verò mixtus, vel erysipelas fit phlegmonodes, vel phlegmone erysipelatos: nomen quidem sumens ab humore dominante, † denominationē verò accipiens ab altero. At verò ex his omnibus accenditur febris, ratione societatis. Semper enim simul cum eo quod incaluit, pars continua calefit, quousque affectio ad cor ipsum peruenit. Nam & continuè carbunculis partes cum eis simul calefiunt, genitis ex sanguine per-

quā.

Ex inflā
matione
febris.
† ῥέυμα.
† ἰγρυσί-
πλευρά
δης.
† φλεγμο
νώδης.
† ἐπὶ πυ-
μικρὰ
si aduen-
titiū no-
men &
ex acci-
denti su-
perdatū
velut co-
gnomen.

quàm calido, sed magis melancholico propter aduersionem.

Pestilentis febris causam esse inspirationem, potissimum quoties corpus in eam dispositionem sit praparatum, quoniam maxima pars generationis morborum est corporis praparatio.

CAPVT VI.

C Alidiores præterea ambientis nos aeris conditiones (quales sunt circa Canis syderis ortum) potissimum per inspirationem perspicue cor ipsum calefaciunt: extrinsecus verò circumfluente corpori, totum ipsum calidum reddunt, maximeque arterias: vt que nonnihil substantiæ ipsius ambientis aeris attrahant ex quibus omnibus simul afficiatur cor necesse est, atque ipsum in primis immodicè calefiat, maximeque febrili dispositione tentetur, atque toti subinde corpori immittat oportet. Vbi verò pestilentes subeant conditiones, inspiratio potissimum causa est. Interdū enim efficitur febris propter humores in corpore aptos in putredinem, quoties animal breuem quandam occasionem ab aëre circumfluente susceperit: sed magna ex parte incipit ex aeris circumfluentis respiratione, quem putrida exhalatio *Putredinis aeris principia.* infecit. Principiū autē putredinis, aut multitudo mortuorum est minimè crematorum, **C 3** quem

quemadmodum in bello fieri solet: aut exhalatio paludis cuiusdā aut stagni tempore æstiuo atq; interdum immoderatus calor circumfluentis aëris est principium, quemadmodum in pestilētia quæ Athenienses inuasit (vt Thucydides ait, viuētes homines in suffocatis nec ita perflatis tugurijs æstate corruptio afflicbat. Est autem initium pestilentis febris, eò qd humores corporis ex prauo victu sint in putrefactionem parati. Forsitan autem accidit id propter continuitatem, qd ex Aethiopia fluxerunt quædam mala: inquinamenta: quæ ijs qui habebāt corpora læsioni parata, causæ febris extiterunt. Huius enim semper meminisse oportet toto hoc sermone, vt nulla causa sine corporis aptitudine efficere possit: alioquin omnes qui in sole diuersantur æstiuo, in febrem inciderēt, & qui plus æquo morientur, aut bibūt, aut irascuntur, aut morerent. Nec secus omnes ægrotarent circa Canis syderis orrum, atq; in pestilentia perirent. Sed (vt est dictū) maxima pars generationis morborum est, afficiendi corporis præparatio. Subijciatur ergo pro exemplo in ipso aëre inuehi quædam pestilētiæ semina: atq; eorum corporū quæ versantur in eo, hæc esse variorum excrementorum plena, paratorum quidem ex seipsis putrefieri, illa sine excrementis ac pura. atque addatur prioribus interesse obstru-

τὸν αἶρα.
aërem.

*corporis
præpara
tio bonā
partē a
ctionis si
bi vendi
sat.*

*Agē
nis viri
ac passi
aptitudo*

obstructionem meatuum vndique, ac plethoram appellatam, ac vitam otiosam in multis epulis & ebrietatibus & Veneris vii immodico & cruditatibus, quæ omnia prædicta necessario consequuntur. Alijs autem omnibus corporibus puris ac sine excrementis insit vltra ea quæ diximus commoda, quod omnibus spiraculis corporis neque obstructis neque pressis angustia bene transpirat: exercitatio verò prudenter instituta, ac victus ratio moderata. deinde his ita subiectis, cogitabis num sit verisimile vtraque corpora conspiratione putridi aëris affici. Nonne consonum est hæc statim à prima inspiratione initium putredinis accipere, vnde in maiorem [†]noxam prolatabatur, quæcunque verò vacua excrementis & pura sunt, ea vel nullo modo vel exigua labe infici vt faciliè ad habitum naturæ recurrant? Idem quoties aëris temperamentum ab ipso naturæ habitu immoderatè recessit ad humiditatem & caliditatem, pestilentes fore morbos necesse est: affici autem his maximè, eos qui iam prius pleni fuerint humiditate excrementosa: quemadmodum qui laboribus moderatis ac victus ratione temperata vti sunt, penitus impatibiles permanent per omnes eiusmodi affectiones. His sermo sup vno exemplo dictus est, sed in omni genere cause verus est. Ac cui libeat integrè in eo exerceri,

Imbecilla con-
coctionis
causæ.

† hæc
sup, id est
noxam.

Impati-
biles ab
aëre pe-
stilent.

legat librum de causis procatarcticis, id est,
 externis. Ego verò præfenti libro parcès lon-
 gitudini, vno capite omnē eum comprehen-
 dens, finem faciā. Oportet enim in vnoquoq;
 causarū genere scrutantem qua potissimū fa-
 cultate morbos cōmittere soleat, deinde con-
 siderare congruentes & repugnantes ei dispo-
 sitiones corporū: scientem vt congruentibus
 quidem prompta læsio est, aduersus autem ac
 repugnantibus, quantam vim habeat & ma-
 gnitudinem cōtrarietas, tātū inuicti perma-
 nebūt. Ipse nanq; vidi nonnunquā euenien-
 re tali conditione qualem Hippocrates in op-
 pido Cranone fieri dixit, carbunculos grassa-
 tos non paucos, quorum generatio & alia om-
 nia eo quo ille scripsit modò, planè fuerūt.
 Quinetiā quæcunq; tertio libro Epidemion
 in pestilenti scripsit conditione, ea etiam om-
 nia per aliam similem illi conditionem exti-
 terunt. Summa eorum (vt ipse Hippocrates di-
 xit) putredo fuit, atq; id ipsi cognoscentes,
 statim incipiente conditione quæcunq; cor-
 pora vidimus humida, statim quouis modo
 exiccare tentauimus: quæcunq; verò sicciora,
 pristinam naturam in his custodiuius: quæ-
 cunque verò excrementis plena, purgationi-
 bus sanauimus: quasunque verò obstructio-
 nes meatuum, soluius atque aperuius. Sed
 hæc quidem iam quodam modo ad medendi
 metho-

Facile et
 diffici-
 le pati-
 bilia.

Initio. 2.
 epid.

Conditio
 ne pesti-
 lēti quid
 agendū.
 Cōmēt. 3.
 statim i-
 nitio.

methodum pertinent, & scilicet in eo opere fusissime dicentur. Nunc autem eorum mentionem feci, sequutus sermonem docentem quonam modo ab vna causa exuperante quidamprehenduntur febre, alij impatibiles permanent. Dispositiones enim corporum dissimiles, multiformesq; sunt: & idcirco quidam facile vincuntur, ac promptissime patiuntur à causa agente: alij inuicti penitus & impatibiles sunt, aut difficulter patiuntur. Ad eius rei demonstrationem coacti sumus mentionem fecisse etiam curationis, perinde vt Hippocrates facientes, qui alicubi eodem quodam modo celebre illud verbum adscripsit. Id autem sanatio ipsa indicat.

De præcautione, & quonam modo diaria febris ex bubone consistat. CAP. VII.

PRæcautio igitur secundum talem quendam modum sanatio est. Quando & ipsa nomina sæpenuerò confunduntur apud medicos. Vt enim alio libro diximus, omnis medici operatio corporis ipsius vitia corrigit. Sed nihil ad proposita, huiusmodi nominum subtilitate egemus. Siue enim feces in duo nomina totum id, sanationem ac præcautionem, siue in vnum ambo colligas, sanationem appellans: non paruo argumento est, non omnes ab eiusmodi causa
Præcautio.
Medici officium.
similiter

Epidemiorum morborum præcautiones.

Hic initium alij faciunt 7. capit. Quæstio

Febris ephemera generatio.

similiter affici, dispositio corporum quæ prohibita sunt corripì epidemijs ac pestilentibus morbis. Vnum enim primumq; consilium in omnibus cōmune est, vt corpus maximè vacet excrementis & ad traspiratum habile sit, secundum verò post hoc, vt exuperanti causæ repugnes, quoad fieri potest. Quibus verò contraria horum insunt, ocysissime patiuntur, maximeq; egrotant. Sed quoniam febrium pestilentium mentionē feci, ex putredine omnium ortam habentium, par est incumbentem animo ad hunc sermonem explicandū hoc loco scrutari de antiqua opinione, omnē febrem consistere ex humorum putredine dicente. Videntur enim ita sentire ij qui ab Athenæo fluxerunt, non obscuro quidem viri in hac arte, præsertim in ea quæ est de febribus scientia: in quibus ego plurimū cum illis sentio, veruntamen vnum excipio, diarias nominatas febres. Non enim mihi videntur hæ subsequi putredinē humorum: sed qui ob æstum febricitat, ab ipso efficientis causæ calore alterari solet. Ob iram verò febricitanti, & ei quidē ebullitionē quandā fieri sanguinis in corde necesse est, nō tamen putredinē. Nec non per exercitationē, caliditatē ampliōrē pter naturā sine humorum putredine accēdi. & quisquis curē habuerit adstrictā, per quā acria excrementa euacuabātur, illis collectis febricitauit

sine

sine putredine humorum. Quinetiam febris
 ex bubone omnis, mala est, excepta epheme *Febris ex*
 ra, vt Hippocrates dixit: licet etiā bubo ipse *bubone*
 inflammationum genere contineatur. Atq; *duplex,*
 assentio in hoc sermoni putredinis, nam ob *epheme-*
 eam rem ex inflammatione febricitant, non *ra & pu*
 quemadmodū Erasistratus existimauit. Atta *trida.*
 men nonnullæ sunt ex bubone febres in ge
 nere diariarum, quemadmodum alix quædā
 nunciant non faciles curatu morbos, ex in-
 flammatione, aut vlcere, aut abscessu, aut al-
 tero quopiam tali in viscere affectu ortū ha-
 bentes. Cæterum dissident febres ex bubo-
 ne ab ijs quæ ex putredine humorum consi-
 stunt, quæ fit aut in aliquo viscere, aut in ca- *Epheme*
 uis ac maximis vasis: quoniam vbi febris ex *ra et pu*
 bubone consistit, pars continua semper cale- *tride fe-*
 fit, ac calor quidē vīq; ad ipsum cor distribui *bris di-*
 tur: ceterum putrida fuligo vīq; ad ipsum mi- *scrimen.*
 nimè peruenit, sed ibi manet circūscripta in
 bubonis loco, per alterationē solā continua
 rū partiū ad cor perueniēte calore. Quo po- *Excep imm*
 tissimū modo, etiā per æstū ac per exercita-
 tionē ex partibus primè calefactis, distribu-
 tio ad ipsum principiū vitale fit. Vbi autē pu- *Di. Scannia*
 tredo fuerit in visceribus atq; in magnis va- *Humor. In*
 sis, veluti fumus ex putrescētibus humoribus *cunctim*
 ad ipsos cordis sinus peruenit. Accidit igitur *putre -*
 vt humores in bubone quidem omnes cun- *scens.*

Sim

Et im putrescant, siue vno die, siue duobus cō-
 tinenter: vtpotē semper inuicem conuersan-
 tes & inclusi vno loco: in visceribus autem
 conditi, & in magnis vasis, vtpotē transfluen-
 tes semper, ac simul putrefacientes quos atti-
 gerint, tempore ampliori putridū accendūt
 calorem. Sed vt vno verbo dicatur, quemad-
 modū in exteris omnibus, quacunque cale-
 fiunt præter naturā à quauis causa, si nequeat
 putrescere id quod calefit, velut lapis, aut li-
 gnū, aut aliquod aliud tale, eò vsque perseue-
 rat calidum quoad refrixerit paulatim. Id au-
 tem quod putrescere potest, depauescentem
 semper secundum continuitatem habet calo-
 rem. Quemadmodū interdum vidi in agro
 sterus pecudum simul & columborum ex
 parte quapiam ab ipso sole calefactum ita
 vehementer, vt multa exurgeret exhalatio, in-
 star fumi ascendens, vehementer mordens at-
 que afficiens, & si quis propinquasset, oculos
 & nares lædens. Porro sterus tangentibus
 erat ita calidum, vt deureret diutiūs imposi-
 tas ipsi manus, aut pedes. Non tamen semper
 id symptoma durabat: sed sequenti die refri-
 gerabatur quidem quātū steroris ad sum-
 mum feruorē pridie peruenerat: quod autem
 continuū ipsi erat, tūc succēdebatur, quando
 primū sterus in summo feruoris vigore erat:
 illudq; ipsum (dum hoc inclinabat) rursus
 inca-

*ferentiam aspi-
 cientes spon-
 dit. Calor cō-
 tinuē pu-
 trescētia
 depascit.*

*Analo-
 gia.*

incalebat atque efferuescebat, ac paulò pòst
 summum feruorè obtinebat, primo refrige-
 rato atq; illud rursus inclinabat, dū id quod
 continuū erat, calorè concipiebat: & paulò
 pòst accendebatur quidē hoc & ad summū
 feruoris perueniebat, prius autem refrigera-
 batur. Erat autem hæc circuitio ferè tempus
 diei ac noctis: ita vt exemplū sit maximè cō-
 ueniens febris quotidianæ. Si verò duobus die-
 bus ac noctibus dicta circuitio fuisset, exem-
 plū foret ita febris tertianæ: & si tribus, quar-
 tanæ, & si quatuor, quintanæ, si modò febris
 vlla quintana est, ipse enim nondū perspicuè
 vidi, neq; eam circuitiōnem, neq; aliquā aliā
 vltra quartanam. Sed de febribus repetenti-
 bus per circuitiōnē, pòst dicetur. Putredo au-
 tem humorum quæ fit in vasis, similis putre-
 dini quæ in inflammationibus fit, & abscessi-
 bus, & alijs phymatis, duplex quidē genere
 est: ex permixtione autem duorū generum,
 alia tertia varia specie existit. Siquidē & mi-
 xtionis modi, quū alterum genus maioris
 minorisq; ratione superet & superetur, faci-
 lè numerari non possunt. sed ex duobus ge-
 neribus alterum quidē fit superante natu-
 ra, alterum verò cuictā. Superante quidē, vt
 per inflammationes & phymatosos tumores
 omnes, pus: in humoribus autem venarum &
 arteriarum, id quod subsidet in vrina pro-

*An sit
 quinta -
 na febris
 Hic aliij
 faciunt
 initium
 cap. 8.
 Putredo
 triplex.*

*Pus supe-
 rante na-
 tura.
 Substan-
 tia puri
 proportio-
 nabilis.*

por-

Putredo portione puri respondens. Atque hæc putredo non simpliciter putredo censeretur, sed e iâ
cōcoctio- habet aliquid concoctionis. manente enim
ne permi- adhuc cōcoquendi facultate vasorū, putre-
xta. scens tunc humor ad talem alterationē dedu-
 citur. Porro alia est putredo concoquendi fa-
 cultate ad eò debili, vt nulla mutatio ad be-
 nignum putrescentis excrementi efficiatur.
Putredi- Quod fit interdum illa extremè debili: quā-
nis sim- uis putrescens humor sit modicè prauus. in-
plicis interdum autem facultas ad extremam debili-
causa. tatem minimè deducitur: sed humor extre-
 mē prauus existit. Huiusmodi excrementi pu-
 tredo, neque consistentiam, neque colorem,
Puris & neque odorem habet vnum: sed putrescens
putredi- humor semper secundum substantiā permu-
nis disci- tatur ac variatur. Altera verò putredo quā &
mina. concoctionem esse diximus, in vnam speciē
 puris semper mutatur, & colorem, & consi-
 stentiam, & odorem.

Quod pus optimum sit candidum & crassum
 & minimè fetidum, & quod optima vrina ha-
 beat sedimentum candidum, æquale ac minimè
 fetidum, & quibus indicijs febris diaria cogno-
 scatur.

CAP. VIII.

*Pus opti-
mum.*

VBI igitur natura ipsa omnino superet
 pus optimum gignitur, visu candidū

ac

ac crassum, & sibi simile vndiq; : læue autem tangenti, ac minimè foetidum. Quòd si velut semiputridum fuerit, tertiū genus in tali mutatione (quod paulò suprà diximus) consistit. Porro diximus tale genus maximè multiplex esse. Nam q̃ magis ac minùs recipiat

*Pus mul-
tiforme.*

concoctionem, innumerabilis differētia est. Sæpe enim candidum effectum, aut foetidū est, aut tenuē consistentiā : quandoque verò non candidum, sed liquidum apparet, atque in omnibus his magis & minùs est infinitū. Caterū quot in abscessibus putredinis differētiæ sunt, tot in febribus ex putredine accensis † vrinarum formæ existunt. Optima enim quæ putrido humore ea virtute quæ continentibus vasis insita est, candidū, læue, æquale, ac minimè foetidum sedimentum habet. Pessima verò, maximè contraria huic est. Ea verò quæ media est, quò magis alteri earum propinquet, tantò melior aut deterior est. Sed de vinarū differētia † libro de indicationibus docuimus. Febres autē accensas ex putredine humorum, alias à diarijs esse existimare oportet. Atq; harū agnitio nequaquam difficilis est: quamuis impossibilis

Abscessus et vrinae, sunt proportionales Optima vrina. † ὁμοιογενὴς τῷ οὐρῷ, id est eorum quæ in vrinis invehuntur. quæ

hic ὑπερόμνη, alio loco παρὰ ὑπερόμνη, nebule sunt sublimamenta, & sedimēta. Nam vrinæ substantia in liquore, est accedunt autem ὑπερόμνη. † Lib. I. cap. 12.

quibus-

*Febris e-
phemera
indicia.*

*Causa p-
gressa.*

*Vrina
statim cō
cocta.*

*Pulsus
magna
citaq; di-
ductio.*

*Contra-
ctio nihi-
lo conci-
tior.*

*† ἄλλο-
τι.*

*Pulsus et
calor a-
quabilis.*

*† Fortas-
se sic. at-
que hac
commu-*

quibusdam esse videatur. idq; re ipsa millies
indicauius, primâ accessione sedata, lotum
ac modicè cibatum ad solitas operationes re-
dire præcipientes: ceu postea nō febricitatu-
rum, & ita accidit. Vnum igitur ac primū in-
diciū febris diariæ, est ab aliqua causâ præ-
gressa incepisse recenti atq; euidenti: quam
consueuerunt omnes medici iuniores appel-
lare causam procatarcticā, id est, pregressam.
Sed id quamuis inseparabile sit ab huiusmo-
di febribus, earū proprium minimè est: quo-
niam & aliæ nonnullæ incipiunt causa qua-
dam euidenti prægressa. Inseparabile verò &
proprium est, vrinæ concoctio statim primo-
die: & ad hæc, pulsus in magnitudinem ac ce-
leritatem insignē auctio, ita vt frequētia per
exteriorem quietem minimè seruet propor-
tionem. Magis præterea proprium, atq; inse-
parabile earū indicatiū est, qd contractio mini-
mè crescat in celeritatē: vel si crescat interdū
id minimum est, ac cognitu difficile, & pau-
lū à pulsu naturali recedens. Quinetiā ca-
loris suauitas proprium atq; inseparabile est
talium febrium. Inseparabile verò & æqualitas
& ascensus † liber tum in caliditate, tum in
pulsibus, non tamē proprium est. Etenim qui-
busdam alijs inest: quemadmodum & status
clementia. neque enim id proprium est, quā-
uis his potissimū insit. † Ac melius quidem
fuerit:

fuerit hæc quæ cōmunia sunt, q̃ per incrementum ac vigorem diarijs præcipuè insunt, dem, se- inter propria reponere. Sit enim ita, quam- cundum uis non rei species, tamen optimum certis- incremẽ-
simumq; talium febrium proprium simul at- ta et sta-
que inseparabile indicium: quemadmodum tus, me-
inclinatio quæ cum sudore aut madore, aut lius est p-
penitus vapore quodam suauis est, quam inte- pria po-
gritas perfecta excipiat. Atque his indicijs fe- nere, q̃
bres diariæ, promiscuè cognoscuntur. Sed de diarijs
singulis seorsum secundum speciem agetur. precipuè

Quibus indicijs cognosci conueniat febrem pu- insunt.
tridam, ac de duritie pulsus nonnulla contra Ar- T Es enim
chogenem. ex pro-
CAP. IX. prietate

ALIVD autem genus febrium, q̃ quæ om-
ex aduersum diarijs diductum est, ni soli et
nullum nomen commune omniũ semp in-
habet. Differentiæ autem primæ est, speci-
duæ existunt, non obscuris speciebus defini- es rei cō-
tæ. quedam enim ex eis putredine humorum stituit.
accenduntur, aliæ verò partes ipsas anima- Febres
lis solidas occuparunt: atque appellant eas he- putrida.
cticas febres, vel quia stabiles sunt ac solutu Febres
difficiles, quemadmodum habitus, vel quia hectica.
ipsum corporis habitũ occuparunt. Ita nãq;
solent nominare solidas partes ex aduersum
diductas humoribus. Febres igitur humori-
bus accensæ cognoscuntur ad hunc modũ.

D Primũ

ciunt iter, vel alio modo in vehementi frigore diuersantur diutius) proprium est & hoc febrium putridarū, sed haudquaquā inseparabile. Neq; enim omnibus ipsis, quemadmodum nec horror, inest. is enim non solum non inseparabilis est ab huiusmodi febribus sed nec vllō pacto proprius est. Caterū pulsum atque etiam calorem inæqualē esse, siue per initia accessionum, siue per incrementa, talium generi febrium proprium est, sed haudquaquā inseparabile (multæ enim etiam sine inæqualitate sensibili incipiunt, atque ad statum perueniunt.) Iam verò multò minus illud inseparabile est, q̃ accessio multas habeat inuasionē: quod repetere accessionē appellamus. Quemadmodum quod pulsus arctior sit (ita verò dicunt, vbi incipiente accessione paruus admodum & inæqualis existat) neq; id talium febrium inseparabile est: non tamen cōmune est alteri vlli generi febrium, sed harum proprium, quemadmodum ipsa inæqualitas, vbi alicuius symptomatis ratione non accidit. Sæpe enim in ipso ore ventriculi collecto quodam prauo humore ac mordaci vel frigido, paruus simul inæqualisq; existit. Sed vbi frigidus humor sit, paruas: vbi mordax, inæqualitas ipsa exuperat. Sed vomentibus, hæc ambo statim desinunt. Vbi verò ventriculus nihil

Horror.

Calor
pulsusq;
inæqualis.Repetere
acces-
sionem.Τ ἐπιπα-
ροξύνει
τὸ λίγισ.Pulsus
arcticus
quæ est.Parui in-
æqualis-
que pul-
sus cau-
sa.

eiusmodi patitur, prædictarum generis fe-
 briū talis pulsus existit. At verò maximū in-
 diciū febrium putridarum, est caloris qua-
 litas. Nihil enim suaue, neq; moderatum, ne-
 que diarijs simile habet. Sed quemadmodum
 optimi ante nos medici dixerunt, mordax

Calor porius quodāmodo est, vt offendat, mordeat
mordax. que tactum, veluti fumus oculos, ac nares. Ve-
 rum inter initia accessionū (dum adhuc sus-

Calor focatur calor, ac succendūtur intrus excremē-
mordax ta) non statim immittentibus manum digno-
inter ini- scitur: sed diutius immorantibus prædictū
tia. caloris genus de profundo emergit. Ac (vt
 mihi videtur) quū tale aliquid vidisset The-

mison propriū atq; inseparabile esse omni-
 bus febribus existimauit. Sed de his suo loco
 rursus agetur. Prædictū autem genus caloris
 perpungens (vt ita dixerim) aut erodens (ve-
 luti medicamentū aliquod acre) impositam
 manū, putredinis humorū soboles est, perspi-
 cūe per incrementa accessionum, atque vigo-
 res febrium apparens: non tamen statim per
 initia accessionum perspicūe existit. Pro-

Contra- prium præterea inseparabile est generi fe-
ctiōn pul- brium ex humorum putredine instantium,
sis velo- velocitas cōtractionis pulsus, euidentior qui-
citas. dem per incrementa, sed minimē obscura per
 ipsos vigores, atque initia accessionum. Co-
 mitatur autem has per initia, paruus simul ac
 velox

velox pulsus: per vigorem autem, magnus si-
 mul ac velox. Nec secus frequentia ipsa per
 exteriorē quietem perspicua est in eius- *[Frequen-
tia p ex-
teriorē
quietē.]*
 modi febribus, neque diarijs, neque hec- *Vrina
cruditae
aut obscu-
ra conco-
ctio.]*
 ticus similis. Maximè proprium præterea est ta-
 lium febrium, urinae cruditas, atque obscura
 concoctio, proprium indicium est febrium
 ex humoribus consistentium. Neque enim
 cruda, neque obscure concocta in febribus
 diarijs existit. Atque alterutra quidem earum
 scorum dicta proprium est febrium putrida-
 rum indicium: sed ambo simul dicta † per
 ipsam enunciationis disjunctionem, penitus *† αα α β
ωααα -
διεξωγ
μινομ α-
ξιωμα.*
 inseparabilia sunt. Quoniam primæ urinae in
 tali febrium genere, vel penitus crudæ, vel
 obscure concoctæ existunt. Magnum verò,
 atque insigne indicium concoctionis in pri-
 mis urinis nunquam existit per huiusmodi fe-
 bres, nisi à diarijs in has transeat: id quod
 paulò ante docuimus. Cæterum ab his quæ
 diximus indicijs propositarum febrium, id
 quoque existit, si per ipsum accessionis vigo-
 rem symptoma quoddam ardentis febris ex-
 titerit: quemadmodum si quod epialæ, ac li-
 pyriæ, vel semitertianæ, vel typhodis, vel alte-
 rius talis febris symptoma fuerit: quæ pro-
 pria quidem sunt generis febrium ex putre-
 dine humorum consistentium, nō tamen in-
 separabilia, & ob eam rem, si quidem hæc mi-

*Inclina-
tio nõ de
finēs ad
integri-
tatem.*

nimè adfuerint, ex alijs indicium quærendū:
si verò adfuerint, non solū genus taliū fe-
brium, sed & species vna aliqua ex ipsis signi-
ficatur. Quòd si inclinatio minimè definit
ad integritatē, siue per sudorem, siue etiā ali-
ter fiat, alterum è duobus erit, aut indicatiū q̃
transeat in alienam febrem, si superiora om-
nia diariæ fuerint indicia: sin. nullum ex his
fuerit, febrem quandā ex humoribus consistē-
tem statim ab initio præhendisse ostenditur.

*Pulsus
prima
die du-
rus.* Vbi verò pulsus prima die durus existat, con-
siderandum num concretio quædam ex fri-
gore, an siccitas, an tensio conuulsifica in cor-
pore laborantis, an inflammatio quædā, an
scirrhus sit: scientes quòd ex his tantummo-
dò pulsus durus efficiatur. Nam Archigenis
errores circa notionem, cognitionemque
duri pulsus, in opere de pulsibus abundè do-
cuimus, in quo versatus sit oportet, qui ad
hæc legenda accedet: ac potissimū in ea
parte quæ de pulsuum dignotione agit. Et-
enim pulsuum ipsorum nomina ac significa-
ta ab eis omnia, omnemq; numerum vno vo-
lumine indicauimus: quod quidē inscripsi-
mus de differētia pulsuum. Sed quonā modo
vnumquenque conueniat dignoscere, alio
volumine diximus in quatuor libros distin-
cto, quod inscripsimus De dignotione pul-
sū. Quæadmodum alios deinceps quatuor
libros

libros de causis pulsuum effecimus: & itē qua-
 tuor ab ijs dictis de prænottiōe ex pulsibus:
 non solum verbis, sed etiam re ipsa indicātes
 huius scientiæ vtilitatem. Et si quis nobiscū
 vnā accessit ad ægros horum librorum specu-
 lationem re ipsa ostendentibus, cū cætera
 ei persuasa sunt, tū verò etiam illud, nō esse
 videlicet durum pulsum aut proprium taliū
 febrium aut inseparabilem. Sed de hoc nunc
 non est dicendi locus: nam prædictis libris
 diximus, & alijs octo libris quibus expendi-
 mus librum de pulsibus Archigenis, abundē
 huiusmodi symptomata docuimus: hoc loco
 quod sit necessarium tantummodò indicabi-
 tur. Pulsus durus, neq; proprius est, neque in-
 separabilis cuiuspiam generi febriū, neque dia-
 riæ, neque putridæ, neque hæcticæ. Sed hæcti-
 cæ inest magna ex parte, atque interdum in
 alijs duobus generibus ob symptoma quod-
 dam existit. In diaria quidem, quoties febris
 affligat ob refrigerationē fortem, vel tensio-
 quædā neruosa inest: atque interdū efficitur
 ob æstum fortem, vel lassitudinem simul, vel
 inopiam alimenti, vel vigilias immodicas, vel
 euacuationem: quoties ob alimenti defe-
 ctum hæc quoque constiterint. Per febres au-
 tem putridas pulsus quoque durus habetur,
 quoties in viscere inflāmatiō fatiget, vel scir-
 rhus: & ob symptoma aliquod coniunctum,

*Pulsus
durus.*

*Febriū hæ-
cticæ.*

*Pulsus
indiaris
durus.*

*Pulsus in
febre pu-
trida du-
rus.*

† οὐκ
 παρ.
 nempe aut nervosam aliquam tensionē , aut
 siccitatem, durus quoque sic pulsus euadit, ve-
 lut & ijs qui intempestiuē frigidam biberūt,
 aut eadem lauerunt: vel † fructus quosdam
 largiter comederunt. Sed pulsus durus nun-
 quam efficitur per ipsam febrem , quā febris
 est: neque per ipsam diariam , neq; per ipsam
 putridam: neque enim quoties ex inflamma-
 tione febris affligat, eodem modo febris ac
 pulsus durities comitatur: sed febris quidem
 sequitur putredinem humorum: durities au-
 tem tensionem ex repletionē vasorum. Nam
 Duriti- (ut semel dicatur) durities tunicis arteriarum
 ei pulsus accedit, vel propter concretionem, vel tensio-
 causa. nem, vel siccitatem. Concretionem igitur re-
 Duritiei frigeratio vchemens committit: tensionem
 arteria- verò inflammatio ac scirrhus, atque etiam
 rum cau neruorum proportionalis inflammationibus
 sa. dispositio: siccitatem verò euacuationes diu-
 Cōcretio tinæ, vel ob alui fluorem, vel læuitatem in-
 nis cau- testinorum, vel difficultatem intestinorum,
 sa. vel vomitum longum, vel aliud istiusmodi,
 Tensionis & fames diutina, atque ardentes febres diuti-
 cause. næ, & (ut in totum dicatur) quæcunque ve-
 Siccita- hementer exiccant ipsius animalis partes soli-
 di cause das, velut & hectice: de quibus nūc dicere fue-
 ristica. rit tēpestiuum, ab earū generatione exorsis.

Quibus indicijis febris hectica cognoscatur, &
 quonam

quonam modo cōsumpto admodum humore cordis dispositio efficiatur, quam Philippus nominat ex morbo senectam.

CAP. X.

FEBRIS igitur hectica nomine efficitur duobus modis, magna ex parte *Hectica sit duobus modis.*
 ob febres ardentes, quæ prorogantur adeò, vt consumantur spacio temporis humorem corporis cordis, vel etiam si adhuc multus permaneat. Illa igitur non solum hectica, sed etiam marasmodies iam existit. Hæc verò quæ manente adhuc humore fit, corpus ipsum cordis præhendens, indè maxime accenditur: quemadmodum lucernarum flamma ex ellychnio. Atque vna quidem eius generatio est prodita. Reliqua autem est, quoties statim ab initio præhendat, *Hectica ab initio præhendens.*
 primam generationem similem habens diarræa eb mœrorem, iram, lassitudinem magnam cum vitione contractam. Hanc igitur febrem sanare nequaquam difficile est: quæ *Hectica curabilis.*
 verò ex eis deuenerit in marasimum propter incitiam eorum qui adhibiti sunt medicorum, eam sanare non solum non facile, sed etiam impossibile est, quoties planè iam confirmata fuerit, nec prætereà incipiat. Natura enim eius calida ac sicca existit, ac cor similiter afficitur, vt ellychnium in lucerna, quoties plurimum crematum fuerit. Etenim ita *Analogia.*
 exutum friabile fit, atque dissoluitur, perditurque

† nec
 aliā
 diffu-
 gitur.

Febris
 maras-
 modes.
 Marcor.
 Mors si-
 ne mero-
 re.

Ex mor-
 bo sene-
 sta.

Febris
 maras-
 modesca
 lida est
 & sicca.
 Analoga.

turq; cōtinuitas præ ariditate: vt neq; si affun-
 das abundē oleum, queas rursus accendere
 flammam copiosam. Parua enim atque infir-
 ma flammula in ipso † concutitur, ac semper
 minor efficitur, vsquequo extinguitur. Atque
 exactē quidem marasmodēs febris huiusmo-
 di existit, nec eadem est cum affectu marco-
 re. Hic enim in ijs efficitur qui consenuerunt
 sine febre, extincto in illis natiuo calore (que
 potissimū mœrore vacua mors est, ac secun-
 dum naturam ex siccitate consistens) velut &
 in ijs qui emarcent præter naturam, genus il-
 lud efficitur, quod Philippus nominat ex
 morbo senectam. In quam multos nouimus
 non senes solum, sed etiam pueros incidisse.
 Febris autem marasmodēs non solum sicca,
 sed & calida affectio est. Extinguitur autem
 per eam multo celerius calor in animali, atq;
 tabescit totum corpus instar arboris in ple-
 num arefactæ, vel ob temporis longitudinē,
 vel flammæ vicinitatem, vel fortem atq; im-
 moderatum squalorem. Sed de tota marcoris
 affectione, seorsum diximus. Hecticæ autem
 febris, cum duplex eius genus sit, vt antè di-
 ximus, indicia deinceps explicabimus.

De febre hectica, & quod diaria sæpenuerò
 transmeet in hecticam: cuius rei indicia multa
 existunt.

CAP. XI.

Febris

FEBRIS igitur hectica cum marcore *Hectica*
coincidēs, promptissimè ac facillimè cū *mar-*
cognosci potest. Prius enim quàm tã *core indi-*
gas pulsū atque calorem, oculos su *cia.*

pra modum cauos videbis, quasi in fouea qua *Oculi cō-*
dam cōditos, ob totius humidæ corum, sub-*caui.*

stantiæ consumptionē: ita, vt ossa quibus pal- *Palpe-*
pebræ annexæ sunt, promineant. Quinetiã *brarū os*
lippitudines in eis visuntur aridæ, ac quædã *sa promi-*
tqualida dispositio, qualis maximè inest eis, *nentia.*

qui per puluerem multum tota die in sole ca *Lippitu-*
lido fecerunt iter. Flos ipse præterea viuudus *do arida.*

coloris perijt, atque id toti faciei accidit, & *squali-*
immoderatus squalor habetur totius cutis cir-*ca dispo-*

ca faciem, maximeq; circa frōtem: ita, vt pro *Color si-*
pter siccitatem, sicca atque intenta sit, non ta *ne flore*

mē queūt palpebras ipsas multum attollere, *viuido.*
perinde affecti semper vt qui dormit vriūt. *Frons sic*

Quinetiã conuiuet magna ex parte, quæad- *ca inten-*
modum qui dormitant. Est autē talis affectio *taq;*

nequaquàm somnus, sed impotētia vigilādi. Affectio
Carnes præterea consumptæ sunt circa tēpo *somno si-*

ra, ita vt ea loca collapsa, cauaque appareāt. *milis.*
Nec quicquā aliud omninò quàm ossa, ac cu *Impotē-*

tis sunt: ita, vt si eos nudos perspicias, in vētre *tia vigi-*
nullum superesse intestinum, nec vlla viscera, *landi.*

atque hypochondria ipsa retracta esse ad tho- *Tēpora*
racem admodum videantur. Quod si libeat *collapsa.*

illos tangere, cutis quidem perquam sicca *Totū ossa*
existit, & *cutis.*

Hypo- existit:& vbi attollas apprehendens digitis,
chōdria quasi corium quoddam stat. Pulsus autē gra-
ad thora cilis, durus, debilis, ac frequens habetur. Ca-
cem re- lor autem in primo quidem occurſu debilis,
tracta. ſed paulopōſt acer atque erodens apparet:
Cuius ta maximeque vbi tangendo diutius immore-
ētis ſicca ris Sed minimē conueniunt reliqua indicia cō-
et qua- memorare in re tam perſpicua. Itaque ſatius
ſi coriū. eſt, vt ad ipſum marcorem adhuc incipientē
Pulsus. veniamus. Marcor ergo incipit, quoties hu-
Calor. mor inſitus in vnoquoque corpore diſperſus
 per loca media partium ſimilariū, ex quo
 membra primū aluntur, ſerē in ipſo corpo-
 re cordis nullus amplius ineſt. Quouſq; enim

Heſti- aliquid ipſius ſeruatur; heſtica febris tantū-
ea citra modō eſt, nondum tamen maraſmodes. Vbi
marco- verō ſerē nihil inſuper huius humoris exiſtit,
rem. exquisitus, iam marcor conſiſtit. Difficilis er-
Heſtica go cuiuslibet heſticæ febris diſpoſitio eſt,
difficilis. quoties ipſius principij tempus præterierit.
Heſtica Definio autem principij, non dierū vel ho-
princi- rarū numero: quæ admodū neque in ceteris
pium. morbis, ſed ipſa qualitate diſpoſitionis, etc.
Heſtica nim dū corpus ipſum cordis diſcedit ab ipſa
genera- temperie naturali, non ſtatim inſitus humor
tio. perit, neque facultas debilitatur: ſed in primis
Humidi velut ebullitio quædam efficitur ipſius humo-
tatū e- ris. quo tempore talis febris facillimē cura-
bullitio. tur: quippe quod facultas nihildum perpeſſa
 eſt.

est. Deinceps autem consumptio quædam fit *Humida*
ob ebullitione, eaque ipsa amplius iam pro- *consum-*
cedente, ipsa etiam corpora simularia, quæ ve *prio.*
lut elementa cordis existunt, sicciora euadūt, *Simila-*
minusque alimenti sentiunt: ac facultas debi *riū exar*
lis redditur tantum, quantum siccitas ac calidi *sio.*
tas in eo exuperat. E quibus alterum sufficiens *Hæctica*
erat, ut exuperans infirmam redderet faculta *triplex.*
tem. Talis febris iam quodammodo medio ge *Hæctica.*
nere ambigit, ac media est insanabilis peni- *media.*
tus illius marasmodis, cuiusque quæ paulo an- *Marcor*
te diximus, adhuc incipientem facillimè posse *incura-*
curari. Atque in ea perquam multa latitudo *bilis.*
existit, quoniam non parua affectionis ipsius
permutatio maioris minorisque ratione est,
Itaque quoties ab utraq; febre discedit æqua
liter, ab exquisita scilicet marasmode, eaque
quæ nondum quippiam eiusmodi habet, me
dia quodammodo est, & ad curationem am- *Ambi-*
biguum habens utroque versus momentum. *gens.*
Quæ autem marasmodi propior est, iam pe- *Propior.*
riculo propinquat: quæadmodum priori alte *periculo.*
ri propinquior, spem obtinet non parvam sa *Spei pro*
nitatis. Sed tempus est ut ad earum indicia *prior.*
transeamus: & primum quidem illius quam *Hæctica*
posse facile curari docuimus, nisi in vulgare *incipiens*
quempiam medicum incidat. Est autem, ubi *sola.*
sola consistit, nequaquam difficilis cognitu: *Putrida*
implexa autem cuiuspiam putridæ, depræhen- *implexa*
su dis-

Pura he- fu difficilis iam existit ob permixtionem. Sed
clix in- primam subijciamus ipsam solam ex quadam
dicia. causa prædicta consistere, atque appareant
Causa p- in ea prima die cuncta indicia febris dia-
gressa. riæ. Simul igitur cū eis apparebit statim cau-
Febris ut sã prægressæ genus, atq; id indicabitur pro-
epheme- cedente oratione. Sed interrogando ægro-
ra in se- tum ipsum licebit discas, si alijs in rebus non
cundum malè affectus, ex ira forti tantummodò, vel
diem ex- mœrore, feblicitare incepit. Quòd si vi-
tenta. deantur hæc ita se habere, febrisque extenda-
Sine inte tur vsque in secundum diem, nequaquam de-
gritate. sinens ad integritatem: sed neque vehemen-
Calor ni tior euadens, si squalidior quidem appareat,
hilo vehe suspicari hecticam fore talem debes. Quòd
mentior. si tertio die sine cibo transmittere voluerit:
Squalidi suspectas horas accessionis, quæ tertio quo-
tas. que die præhendere solet, ac neque additio
Tertio vlla facta sit, neque minutio insignis: sed pri-
die ine- mæ febris parvæ reliquæ extendantur, per-
dia. maneanque cum squalido corpore & calo-
Non infi re, mitti quidem in primo occurso manus ap-
gnis mu parente, moranti autem diutius acri, morda-
tatio. ci & squalido occurrente, talem febrem hecti-
Febris cam esse existimare debes. At verò maximū
parvæ re tibi atque certissimum indicium crit naturæ
liquæ. eius nutrito homine quando certissimè vide-
Calor I. tur transiisse omnes horas suspectas. Sta-
occurso tim enim a cibo post vnam horam vel alte-
 ram,

ram, omnibus tangentibus ægrum, alterum *mitis, di-*
incrementum febris ipsa habuisse videbitur. utius im
 Nec deerit qui increpet tanquam intempe- *moranti*
 siuè dantes cibum, & ipso potissimum tem- *mordax.*
 pore accessionis, & dicat diutius fuisse expe- *Ingesto*
 ctandum, & tardasse accessionem. Sed res nō *cibo post*
 ita se habet. Cuilibet enim hecticae febris *horā ca-*
 proprium inseparabile id est, ut ingesto ci- *lor & ve*
 bo calor accendatur, pulsusque in magnitu- *lute qua*
 dinem ac velocitatem increfcit ita ut *lis accefs-*
 lis esse accessio videatur. † Aequalem autem *fo.*
 accessionem voco, in qua nec horror extitit, † *αδμι-*
 nec frigus extremorum, neque somnus, ne *πθ.*
 que pigritia insignis, vel inæqualitas qua- *† αδμι-*
 dam penitus, vel in calore, vel in pulsu, imò *πθρ.*
 nec etiā paruitas, neque debilitas, neq; aliud. *Aequa-*
 huiusmodi quicquam, sed tanquam alij cui- *lis accef-*
 piā nutrito pulsus maior statim ac velocior *sia quid.*
 redditur. Accidit autem interdum & in alijs *Aequa-*
 quibusdam febribus incrementum † æqua- *lis accef-*
 le: & quod quidem ex ipso est, videbitur mi- *sionis dis*
 nime esse hecticae febris symptoma propriū *crimina*
 inseparabile. Sed non parū differt, si ad † *αδμι-*
 vniuersam dictorum indiciorum collectio- *πθρ.*
 nem respexeris. In omnibus enim alijs febr- *Hectica*
 bus tales accessiones æquales existunt, etiam *& cōti-*
 citra alimentum ingestum. In hectica autem *nus dif-*
 penitus contrarium euenit, nullo enim tem- *ferētia.*
 pore accessio præhendit, sed vna cōtinua fe-
 bris.

bris est, velut ea quæ synochos, id est continua propriè nominatur. Sed hæc quidē quasi flammam quandam permultam occurrentem habet imponentibus manum: præterea pulsus quoque velocissimus, frequentissimus, maximusque ei existit. In febre autem hectica, neque caloris multitudo occurrit, ac pul-

Hectica sus tantò minor, rarior, tardiorque est quàm
rum fe- in syncho, id est, continua, quātò calor ipse
brū cō- minor habetur.

munia.

Exigui- De indicijis communibus cuique hectica febre,
tas, & & quam ob causam post ingestum cibum calorem
qualitas ipsum augeri contingat. CAP. XII.

à primo
initio,

Siccitas
cui sit p

pria.

†λοιμῶ.

†ἀθλί-

πῖσι.

†θλίψιμ

Hectica

ab alijs

habenti-

bus equa

lem ac-

cessionē.

COMMUNE igitur cuiusvis hecticæ febris est, ut exigua sit atque æqualis semper, à primo initio vsque ad ultimum finem. Proprium autē eius quæ tibi affinis existit, siccitas est: quoniam hectica febris sæpenuerò sine siccitate consistit, nequaquam transiens in marcorem, qualis etiam nunc multis in magna penuria contingit. febris igitur hectica dissidet à syncho, id est, continua: quemadmodum di-
 ab alijs etiam iam est. Ab aliis autem habentibus accessiones æquales, eo ipso maximè dissidet, quod inæqualitatem quandam illæ omnem accēssionē. fionis præhensionem: hecticæ autē post alimentum

mētū velut accessio quedā æqualis cōtingat: *Differen*
 quæ (vt paulò antè docui minimè accessio *tia.*
 habetur , sed imperitos circa talia decipit ob
 caloris tūm multitudinē, tūm magnitudinem
 velocitatemq; pulsus. Talis autem febris se-
 quenti die planius cognoscetur, si diligentius *Hæctica*
 obseruaris, quandiu permaneat post cibū ip- *non ha-*
 sa pulsus calorisque alteratio. Inuenies enim *bet acces-*
 ramdiu permanere omnium quæ manifestè *sionē, sed*
 apparent alterationem, donec distributio a- *altera -*
 limenti atque adieccio, squalorem cordis hu- *tionem*
 mefaciat : deinde rursus ad pristinum redire *huic simi-*
 statum , qui erat antequām sumeret alimen- *lem.*
 tum. Si igitur alio tempore nutrias ipsum se- *Alterat-*
 quenti die, rursusq; alio tempore sequēti die, *tiōis mo-*
 inuenies ita fieri , vt dixi, augeri quidem ca- *ra.*
 lorem post cibum, pulsūq; ipsum, vt dictū
 est , alterari. Constat enim illis id accidere, *Analo-*
 quod calci ac lapidi calefacto. Si enim eis af- *gia.*
 fundas frigidissimam aquam, multò calidior-
 res sentiuntur, tanquām calor squalidus in eis
 ab humida substantia nutriatur. Quæ autem
 causa sit ob quā ita euenait, quæstio natura-
 lis existit; sed quòd ita efficiatur, cuius tētare
 volenti discere licet. Vbi enim manibus su-
 mas glebulam calcis, contemnes eius calidita-
 tem, ac minimè senties. Vbi verò deponens
 ipsam humi , affundas illi aquam, perspicies
 statim admodum calefieri, atq; adeò feruere

ut lebetes, quoties in multa flamma versentur.

Videbis præterea vaporem ab ea haud exiguum efferi: quod si audeas tangere, facile deuteris. Ad hunc igitur modum ad ipsum sensum,

Humidus calor magis sentitur. humidus calor non paulò habet vim cui dentio rem quàm ficans. Caterum quod calor ficans existat per hæticam febrem cui succedit marcor, hinc discas licebit. Nemo statim ab initio præhensus est tali febre: qui corporis habitum habuerit humidum: sed qui ficior natura

Siccitas hætica marasmo dis arguenda. existit, maximèque, ubi calidus quoque natura sit, & qui vitam delegit in labore, vigilijs, cura, ac victu tenui, is assolet statim ab initio præhendi hætica febre ex ira, ac morore: ac multò magis, quoties æstas, & constitutio calida ac sicca, locusque eiusmodi fuerit.

Hætica tabifica obnoxia. Principium autem eius terminatur, quoties eo tempore quo diaria per inclinationem mitiorem deducitur ad integritatem, adeò nihil

Principium hætica. eiusmodi ipsi accidit, ut siccitas perspicue intendatur: tunc enim primò succedens diariæ, hætica iam efficitur. Desinitur præterea aliter eius incrementum atque perfecta generatio

Hætica perfecta nota. per accessionem tertie diei. Si enim (ut paulò antè diximus) eo die alia accessio minime præhendat, neque æger sine febre existat, sed siccitas ipsi constanter intendatur, talis febris haud dubiè iam hætica est, ac processu temporis marasmodi sine mora enadet, nisi rectè curetur.

tur.

tur. Definitur autē ab itio eius in tabem, cum primū pulsus debilis simul ac durus est, continuoq; parvus ac frequens is necessariò est, nō tamen propterea marasmodies existit, sed propter debilitatem ac duritiem. At verò debilitas accidit ob fortem cordis intemperiem: durities autem, ob siccitatem: quòd si tales affectus praeferant cor ipsum, marasmode febre detineri animal tunc necesse est. In eandem praeterea febrem incidunt ex acuta atque ardenti plerique eorum qui malè curantur: maximèque quicumque ubi frigidam aquam bibere postularent, adeò nihil eiusmodi biberunt, ut nec vllum aliud in frigidās remedium thoraci atque hypochondrijs adhibuerint. Quòd si adeò nihil eiusmodi adhibuerūt, ut insuper cataplasmatibus ex melle plurimum vti sint, quae nunc frequenti in vñ sunt amplius in marcorem incurrere his promptum est, siue solum febricitent, siue ex iecoris aut ventris inflammatione. Maximè enim his inflammationibus haud rectè curatis succedit marcor: ita, ut quidam existimant non aliter posse fieri huiusmodi affectionem, nequaquam scientes, quòd neutrum horum, nec aliud quodquam viscus, aut membrum, neque marcorem, neque penitus hecticam vllam febrem committat, priusquam (ut diximus) cor ipsum afficiatur. Talis igitur

*Abitionis
hecticae
est mar-
corem no-
ta.*

*Pulsus
duri &
debilis
causa.*

*Febris ar-
dentis in
hecticā
abitionis
causa.*

*Viscerū
inflama-
tiones.*

*Hectica
ocasio-
nes.*

affectio ei incipit, interdum ex seipso, ut ex
 ira ac mœrore forti & longo: interdum ex fe-
 bre ardenti: quandoque verò ex affectibus
 pulmonis ac thoracis, maximeque purulen-
 tis ac tabidis. Vt autem ex his, ita accidit ex
 ventre ac iecore: & ut summam dicatur,
 quavis diutina inflammatione in parte prin-
 cipe simul cum siccitate totius animalis, ma-
 ximeque cordis. Ego nanque vidi inflamma-
 tionem laxioris intestini diutinæ succedere
 marcorem, ac stomachi, ac vesicæ, ac renum.
 fuerunt autem nonnulli qui affecti erant dif-
 ficultate intestinorum tali febre correpti,
 quàm scilicet laborassent inflammatione in-
 testinorum. Atque etiam leuitates intestino-
 rum, & fluores intestinorum diutinos, quo-
 ties statim ab initio, aut tempore precedente
 febris exigua incidit, marcor ipse subsequi-
 tur. & ut in summa dicatur, quoties præexic-
 catum cordis ipsius corpus, febrilem calorem
 suscepit, solutu difficilem.

τὸ συνολὸν
 τῶν.

τῶν.

Maximū indicium esse febris hecticæ, quoties ar-
 teria ipsæ sint quàm corpora quæ circiter sunt, ca-
 lidiore: & quòd non oporteat solum circuitio-
 nem, sed ipsum febrium genus considerare.

Arteria
 alijs par-
 tibus ca-
 lidiore.

CAPVT XIII.

Maximum itaq; signum febris hecticæ
 est, quoties arteriæ ipsæ sentiuntur ca-
 lidiore.

lidioreſquàm corpora quę circiter ſunt: quod per alias febres illis minimè accidit. Fit autè ſymptoma adhuc euidentiùs vbi laueris, aut alio quouis modo rarefeceris, ita vt humor quidam profluat, atque calor ipſe perſpiret. Calor enim moderatus in alijs partibus omnibus poſt talem perſpirationem apparet: in ipſis autem arterijs nequaquàm minor eſt priore. Is verò quàmmaximè exquiſitè ſentitur per pulſuum diaſtolas, qui minimè mutatur poſt dictam expirationem: ſed ſimilis penitus permanet. Sola ergo conſiſtens hectica febris perſpicua eſt, ſiue abſoluto ſermone hectica, ſiue etiam maraſmodes ſit. Vbi verò cùm alia quapiam fuerit, difficiliùs iam cognoscitur: quemadmodum quę nuper mulieri cuipiam accidit, cui non ſolùm die, ſed etiam nocte non obſcurè fiebat acceſſio. Latuit enim maraſmodes febris omnes qui eam viſitabant Medicos, exiſtimantes oportere, neque principium præhenſionis ſenſibile eſſe hecticae febrì, neque incrementum, neque vigorem, tanquàm minimè contingat hecticam febrem putridæ alicui poſſe implicari: ſed nobis ſtatim primis diebus in hac muliere cognita eſt. Vtraque enim † acceſſio quę die ac nocte fiebat, breues efficiebat partes acceſſionis, ac ſepe cum madore quodam, aut perſpiratione vaporofa ſoluebatur tam per-

*Hectica
febris pu
trida im
plexa.*

† επιση-
μασία.

spicue, vt corpus ipsum bene temperatum tangentibus sentiretur. Indicia autem in arterijs paulò antè dicta semper extiterunt, nequaquam refrigeratis ipsis similiter alijs partibus, neque velocitatem aut frequentiam motus amittentibus. Quæ ergo alio loco sæpenuerò docuimus, etiam nunc dicimus: non oportere solum circuitiones, atque proportionales accessionum considerare, sed multò prius ipsam speciem febris: ex eaque cognoscere ipsam febrem, quemadmodum ipsum hominem ex propria forma. Sic ipsi sæpe primâ die ad hunc modum speciem febris cognouimus, minimè expectantes tertianam, aut quartanam, aut quotidianam circuitionem. Sed de his secundo libro de iudicijs latius docuimus, atq; eo ipso libro nihilominus diximus quomodo oporteat diariæ febris cognoscere differentias. Promiseram autem (scio) me dicturum hoc loco de illis. Sed cum recordarer pauca in eo libro desiderari, quo in plenum de omnibus præceptum esset alia quidem huc transcribere superuacuum duxi, adijciam verò ea tantummodò quæ intra modum sunt in eo prædita.

Quibus indicijs febres diariæ à se invicem discrepent: quoniam interdum propter æstû, quandoque ex frigore ipso febris diariæ consistit.

Febriçitantibus igitur propter æstū, *Epheme*
 cutis magis ad habitum calidiorem *re pro-*
 & squalidiorem, quàm pulsus ad fe- *pter æstū*
 brilem dispositionem mutatur: quo- *nota.*

circa sitis minùs hos infestat, quàm vbi æqua *Sitis.*
 lein habent caliditatem. Ac primo occurſu *Epheme*
 manus, calor in ipsis vigere videtur, contrà *re ppter*
 quàm in ægrotantibus propter adstriçtio- *adstri-*
 nem. in his enim increſcit. Caput præterea *ctionem*
 peturi maximè videtur, ijs qui propter æstū *nota.*

febricitant. Gaudentque magis & iuuantur
 frigidis fomentis, atque ipsorum oculi cali-
 diores & rubicundiores, videntur, cum sicci-
 rate, antequàm sine grauedine & defluxio- *Graue-*
 ne febricitant. Quibusdam enim propter *do in fe-*
 æstum talia accidunt, caputque ipsis reddi- *bre et de*
 rur non solum calidum, sed etiam plenum *fluxio.*
 sanguine ita vt omnes venæ admodum con-

tendantur, quæ circa oculos & tempora &
 frontem & faciem totam habentur. Quod
 autem pleni sunt non minimum indicium est
 vnde discernantur ab ijs qui ex humorum
 refrigerio febricitant. Hi enim vbi caput *Capitis*
 male afficitur, promptè præhenduntur gra- *graue*
 uedine & defluxione, & febris ipsa inter- *ab æstū*
 dum symptoma est solius in capite dispo- *frequēs.*
 sitionis. Sed magna ex parte tunc magis
 febricitant, quàm corpus totum refrige-
 ratum est, vel exustum. At verò cutis mi-

*Epheme-
ra ob æ-
stum &
frigus dif-
ferētia.*

nūs calida refrigeratis, atque in tumore
maiori corpus existit, nec quisquā squalor
circa faciem, qualis propter æstum febricitan-
tibus euenit sine capitis repletionē. Sed ma-
gna ex parte caput solet talibus repleri ab
æstu, nisi quis fuerit admodum purus, ac sine
excrementis: ijs enim tantummodò contin-
git calefcens caput sine repletionē permane-
re. Veruntamen interdū sine repletionē mul-
tus calor præhendit ipsum totum exustum.
Hæc igitur affectio perspicuè dissidet ab ea
quam frigus excitauit. At quæ cum repletio-
ne est, difficile distinguitur: utpotè defluxio-
nem inferens ac grauedinem, quæ etiam re-
frigeratis accidunt. sed (ut diximus) squalor &
magnus calor cutis, & quæcunque alia paulò
ante dixi, propria vstorum existunt: de qui-
bus in plenum libro de curandi via & ratio-
ne dicetur, cum alijs omnibus diariæ febris
differentijs: quarum dignotiones quia secun-
do libro de iudicijs perstrinximus, nō etiam
hoc loco dicendæ sunt: sed hunc quidem li-
brum hîc finiemus, deinceps verò febrium
ex humoribus accensarū omnes differentias
indicabimus.

PRIMI LIBRI FINIS.

CL. GAL. PER

GAMENI DE DIFFE-
RENTIIS FEBRIVM

LIBER SECVNDVS,

LAVRENTIO LAVREN-
TIANO FLORENTINO

INTERPRETE.



De differentijs febrivm ex humorum putredine infestantium: vbi refellit opinionem ponentiũ omnẽ febrem putridam fieri ex abundantia bilis.

CAPVT I.

SEQVITVR vt de differentia febrivm ex humorum putredine infestantiũ disseramus: id prius de eis admonentes, minime sufficere (vt quidam voluerunt) ad generationem febrivm augeri atq; exuperare humorem biliosum, quem alij pallidam, nonnulli flauã nominant bilem. Omnes enim arquati maximã sic afficerentur febre, quibus copia talis bilis in toto corpore continetur: sed haudquaquã febricitat prius, quã alia quãdam causã concurrat, de qua paulo post agetur. At verò absurdum est in quartana & quotidiana febre exquisita colligi amarã bilem existimare, quemadmodũ in tertiana atq; causo. Etenim contra quã in illis

Non omnis bilis sus morbus est febris.

Arquati

Quartana febris

in

*Febris
tertiana
quibus
accidit.*

*Febris
quotidia-
na qui-
bus acci-
dit.
‡ δὲ οὐ
γὰρ ὅτι in
quibus-
dam co-
dicibus.*

*Febris
tertiana
quotidia-
ne, &
quarta-
ne mate-
ria.*

in quotidiana, & quartana febre, neq; vomitus biliosus neque sudor, neque vrina, neque deiectiones videtur biliosæ: præterea nec quicquam aliud quod præcessit, aut simul adest eis, subscribit. Febris enim tertiana parte plurima consistit in corpore naturâ bilioso, & in etate vigoris, quæ est omnium ætatum maximè biliosa, & æstiuo tempore maximè quo talis humor exuperat. Iridem in regione calida & sicca temperamento & conditione ambientis ætris tali, & vita nō ociosa ac desidiosa plurimū, sed in labore, cura, vigilijs, æstu, & victu parco, coq; calido & sicco. Quin & inmoderatus vñs medicamentorum calefacientium & exiccantium committit febrem tertianam. Quotidiana verò ecōtrario penitus efficitur in natura pituitosiore, ac tempore hyberno, & conditione frigida & humida, senibus & pueris potiùs, in regione frigida & humida, & vita ociosa simul cum repletionem, maximèque quoties post cibum lauantur: ac multò magis, vbi ipse cibus pituitosior naturâ existit. Sed neque vomunt tales biliosum humorem, neque deijciunt, ‡ neque sudant, quemadmodum in tertiana febre. Hæc enim ex flaua bile putrescente fieri solet: quotidiana verò pituitosum humorem subsequitur, quo modo quartana melancholicum. Sic namque natura corporis magis melancholica, & ætas incli-

inelinans, & autumnii tempus, nec non omnia his proportionalia in cibo potuque, & toto victu, frigida & sicca temperamento, febrè gignunt quartanam. Et ob eam rē præcedens eas rigor nequaquam similis est: sed in tertiana quasi pungens ac vulnerans sensum, efficiens causam indicat: in quartana autē quasi refrigerans. Sed de forma rigoris libro de causis symptomatum diffinitū abundē iam est, ubi etiā de eiusdē generis febriū differentia est proditū: nempe ex eis intermittentes (ita appello eas, quæ ad integritatem sensibilibi definunt) ex humore moto ac in omnē corporis partem delato efficiente febrem, consistere: synochos verò ex condito & continuo in venis, de quarum cognitione secundo libro de iudicijs docuimus.

Febrim intermittentem tres haberi differentias: quotidianam, tertianam, & quartanā, atque esse synochon, id est, continuam, quam flava bilis committat.

CAP. II.

Febrium igitur intermittentium omnes differentiarum res existunt: quotidiana, tertiana, & quartana. ex pituita putri, quotidiana: ex utraque bile, flava quidē, tertiana: atrā autē, quartana efficitur. Continuarum verò quæ ex flava bile consistunt duplex genus est: unum quidē earum quæ

Febrim intermittentium species est differentis.

syno-

Cōtinua synochi, id est, continentes appellantur, quæ ex *flaua* rum omne tempus vna accessio est ab initio *bile du-* vsque ad finem: Alterum, earum quæ *complex sy-* ni sed ambiguo genere cōtinuæ dicuntur, & *nocha et* multis particularibus circuitionibus contri- *cōtinua.* nentur. Cæterum synochen differentia om- *Cōtinua* ninò tres existunt. Quædā enim earum ab *rum fe-* initio vsque ad finē æqualis persistit, quædā *briū dif-* paulatim crescit, quædam paulatim decrescit. *ferētia.* Ac nonnulli primam nominant homotonū, *Homoto* & acmaesticam, id est, æqualiter affligentem *nos.* ac vigentem: alteram anabaticam & epacma *Epacma* sticam, id est, ascendentem atque increscen- *stica.* tem: tertiam verò paracmaesticam, id est, incli- *Parac-* nantem appellant. Synechon porrò duæ dif- *mastica.* ferentia primæ existunt. Nam aliæ tertio quoq; die tantummodò habent accessione, aliæ die intermedio alteram inferunt accessi- *Tertia-* onem. Atque hæ nullum nomen peculiare *ne conti-* obtinent. Febrem autem tertio quoque die *nua fini-* accedentem, ego quidem nomino tertianæ *tima.* finitimam: non tamen prohibeo, si libeat, aliter appellare, modò serues in rebus ipsis differentiam. Alia enim est natura, quoties desinunt ad integritatem, alia quoties ad inclinationē febrilem finiuntur, febres continuæ alternis diebus accessiōem habentes. Et ad hæc ubi in medio altera fuerit accessio, natura quædam diuersa est: sed nullam ex his
semi-

femitertianam appello, non tamen prohibeo ita nominare volentes, si id vnum mihi caueatur ab eis, vt nullum febris genus omittatur, sed vnumquodque deinceps dicatur quemadmodum ego nunc in hoc libro facere institui.

Ex continuis enim quę in die medio accedunt, quędam in forma quotidianę procedit, duas accessiones simillimas inuicem efficiens: quędam verò dissimiles habens duas accessiones, primę quidem tertiam simillimam obtinet, secundę verò quartam, in forma duarum tertianarum procedens: sed hæc ex bile potius: illa singulis diebus similiter accedens, ex pituitoso humore consistit. Porro tertium aliud

genus est febrium continuarum raro eueniens, quoties accessio in forma quartanę circuitio nis, procedit, nequaquam desinens ad integritatem. Accidit autem, quemadmodum febris tertio quoque die accedens, interdum duplex ac triplex: ita etiam hæc non solum duplex, sed etiam triplex. Sed hi febrium implexus libro de typis commodius indicantur. Febrium au-

tem simplicium ex humoribus infestantium simplices differentię tot numero sunt, quot proximè docuimus. Ex earum autem permixtione alię quędam efficiuntur, de quibus deinceps dicam, si prius de simplicibus quod deest, adiecero: vt quęcunque fuerit omnino simplex febris, vnā speciem

*Semiter-
tiana*

*Cōtinua
in forma
quotidia-
ne habēs
accessio-
nem me-
diam.*

*Cōtinua
in forma
tertianę*

*Triumfe-
brũ im-
plexas.
τρίπλεξ
σα.*

quasi

Febres quasi regulam quandam obtineat earū, quas *simpli-* proximè indicabimus. Quæcunque verò de *ces com-* generat aliquatenus, eatenus ab ipsis febri- *positarū:* bus simplicibus abscedit.

sunt re-
gula.

Febris ex
flaua bi-
le indi-

cium.

Hora æ-
quinocti-
alis. 15.

gradib⁹
designa-
tur vt di-

stinguat
ab ina-
qualib⁹

et plane
rarijs sol-
stitali-

bus esti-
uis bru-
malibus

jen hy-
bernæ.

Accessio
num ter

Quonam modo ex flaua bile delata in vni-
uersum corpus rigor existat: & vt ipsius tertia-
næ accessio, quod longissimum sit, horas duode-
cim occupet.

CAP. III.

FEBRIS igitur excitata ex flaua bile delata per corpora sentiētia, præhædit cum rigore, atque causodes est: & vomitu bilis, vel deiectione, vel sudore, vel quibusdam horum, vel omnibus simul soluitur. Huius febris longitudo accessionis quæ maxima sit, horarum est æquinoctialiū duodecim: atque appellamus eam exquisitam tertianam, ex temperamento ægri bilioso, ac tempore, & regione, & conditione, & victu calido & sicco effectam. Sed omnia alia paulò antè docuimus, quæcunq; cōducunt ad eius generationem. Atque accessio breuior est magna ex parte, quàm quæ antea dicta est longitudo, per quam multam maioris ac minoris obtinens differentiā: vel propter quātitatem & qualitatem ipsius bilis, vel propter ægri vires, vel propter præsentem tunc in ægro corpore dispositionem. Bilis enim copiosior, longiorē quàm paucior efficit

efficit accessionem: tenuis, breuiorem quàm *tian. adif*
 crassa. Sic verò & vires validiores, breuiorē: *ferētia.*
 imbecilliores, longiorem. Et corporis dispo-
 sitio rara quidē, breuiorē: densa verò longio- *Intermis*
 rē. At verò tempus intermissionis in tali fe- *sionis tē*
 bre, ex pulsu indicium putredinis humoris *pus.*
 penitus obscurum habet, sequēti die ac no- *† adia-*
 cte post accessionem. Leuiter autem succen- *γυνωσκ.*
 sa agrē cognosci potest primis partibus po-
 sterioris diei: sed adhuc clariùs circa fines
 eiusdem diei aut noctis; atque adhuc clariùs
 proximā die vel nocte, quæ præcedit scilicet
 diem aut noctem accessionis. Sanē in ea ipsa
 perspicuum iam est indicium: multoq; magis,
 quoties accessio præhendat: ac multo magis,
 vbi ascendat ad ipsum consistendi vigorem.
 In eo verò † minus quàm per incrementum, † *Vile,*
 rursusque multo minus per inclinationem. *nā ma-*
 Hanc febrem si libeat nominare exquisitam *gis sit le-*
 tertianam, nomine vtēris antiquo: sin minus *gendum.*
 at certē nobis dabis ita nominare gratiā per
 spicuitatis doctrinā.

*Pituitam refrigerare partes extremas per
 initia accessionum, difficulterq; accendi calorē
 minimē purum, sed similem fumo quasi viridio-
 ribus accensis lignis.* CAP. IIII.

Pituito-

ALIA porro est simplex ac exquisita fe- *sa sim-*
 bris ex pituita putri, quæ per membra *plex.*
 sentien-

sentientia pellitur ab ipsa naturâ, consistens.

*Initium
pituito-
se simpli-
cis.*

Ea incipit ex frigore partium extremarum, atque horrore potius, quàm rigore: difficulter accenditur, longumque obtinet incrementum ad ipsum consistendi vigorem: quoniâ humor ipse ex quo consistit, frigidus atque humidus est temperamento, ac glutinosus consistentiâ. Itaque difficulter accenditur, ac tardè mouetur sæpe in ipsis meatibus hærens.

Pulsus.

*Biliose
& pitui-
tose di-
scrimen
inter ini-
tia.*

Ac premit quidem interdum, grauaturque vires. Inæqualem autem ac magis debilem efficit paruumque pulsum in principio ac primo incremento. Per febrem verò biliosam existit inter initia accessionum vnaquæque affectio ex dictis circa pulsum: sed ab illâ quidem citò abeunt, tum alia, tum etiam inæqualitas, quæ magna ex parte nec cum talibus febribus accedit, nec tales febres comitatur. Calor autem ipse non multò postquàm destitit rigor, accenditur luculentus, quemadmodum ignis quidam planè purus, in quo

*Analo-
gia.*

nulla fumosa caligo inuehitur. Calorè verò pituitosi humoris assimilabis igni fumoso lignorum, viridum accensorum. Euacuationes igitur in eo paucae existunt, ac longitudo accessionis diuturnior: & tēpus intermissionis non æquè ac primum purum est, sed semper feruens in calore & pulsus, putredinis humoris indicium. At verò & in hac febre cir-

ca principia, atque incrementa accessionum indicium putredinis est manifestissimum. At tamen & hæc ubi exquisita fuerit, videtur multis habere puram intermissionem: & nos ipsi ita etiam non rarò dicimus, quoties importuna sermonis curiositas videtur. Accidit autè naturæ corporis, tēpori, regioni, tēpēstati, studio, vitui, & alijs omnibus pituitosis. Accedit verò singulis diebus, quamvis minùs calida sit quàm biliosa, quæ tertio quoq; die fatigat. Sed constat hanc quidē (quoniā & humorē habet accensu facilem, & prōptèr semper ob tenuitatem quicquid eius feruescit est per accessionem, expurgatur) ad integritatem quandam magis puram definere, & exiguum post accessionem vestigium putridi caloris relinquere: eam verò quæ ex pituita consistit, nec integrè purgari per inclinationes accessionū, nec exiguum, quod velut succendatur, relinquere. Inde ergo efficitur & intermissio multò deterior, & secundæ accessionis maturius principium.

Intermissio pituitosa.

Humor incēfioni propēsus Accessio nis ad integritatem destinetis causa.

Intermissio deterior.

De quartana quæ ex atra bile consistit: & quonam modo fieri possit, ut rigor sine febre efficiatur.

C A P. V.

V.

Quartana exquise causa

AT verò tertium genus intermittentiū febrium, quartana scilicet exquisita, quoties ex humore melancholico solo efficitur.

sa & intermissio.

F tur

tur frigido siccoque temperie, paulatim quidem succenditur:quemadmodum lapis quidam, vel testa, vel os, vel aliud quoddam sic frigidum & siccum corpus. Vbi verò flamma quædam ex eo accensa est, nihil relinquit fumosum, neque semiustum post accessione: & ob eam rem euacuationes plures ex tali humore quàm pituitoso, & intermissio planè pura esse videtur, eo quòd hinc omne id humoris melancholici quod est ac-

Quarta
narū ri-
gor. censum euacuatur atque discutitur. Et ob eam rem accidit illis rigor, qualis potissimum in forti frigore refrigeratis: non qualis interdum existit per æstum vel lassitudinem, vel medicamentum calidum, ac mordax ulceri adhibitum. Cæterum necesse est hanc febrem antecessisse quicquid colligit atram bilem, ex vitæ genere, victu, cœli statu, tempore, regione, natura & ætate ægri melancholica. Accessio præterea huius febris

Quarta
ne obno
xi. longitudine temporis, tertianæ similis est: atque interdum accidit, ut sit longior, quâvis exquisita sit, quoniam ex humore frigidiore conficitur. Causa autem similis est in his febribus & alijs omnibus quæ differentiam longi-

Quarta
ne acces
sio. tudinis efficit accessionem, quemadmodum in paulò antè diximus in exquisita tertiana: in multitudine & qualitate humoris, & robore & infirmitate virium, & ad hæc ipsa ægri

dispo-

dispositione differentiam habente. Nam & alia omnia proportionē respondent ijs quæ ex humore bilioso consistūt. Quocirca si humor melancholicus neque putrescat, neque vehementer feratur per corpora sentientia, nequaquam efficit melancholicam circumscriptionē exquisitam. Sanè arquatīs affectibus proportionē respondent ex liene morbi diutini melancholici, corporisque totius colores fædi. Et erysipelatibus ac herpetibus qui ex flabile consistunt, cancri & phagedenæ proportionē respondent. Sed neque ex his neque ex melancholicis affectibus necessariò febricitant, nisi prius humor melancholicus & biliosus putrescant. Natura enim semper nititur, suis viribus vtens, assimilare partibus nutriendis quicquid fieri vtile potest: excernere autem id quod minimè istiusmodi est. Quòd si interdum præcrassitie, vel copia, vel lentore excrementi, vel stipatione quadam meatuū, vel sua ipsius debilitate nequaquam possit excernere humorem vniuersum prauum, immorantem diutius in ipso corpore animalis putrescere necesse est. Nullus enim alius humor permanere qualis extitit ab initio, potest, nedum qui adeò vitiosus est vt ab ipsa natura cultū amplius suscipere nō possit: sed aut concoctus apponitur atque assimilatur solidis animalis partibus, aut cor-

*Arquatī
atrabi-
lares.*

*Serpenti-
tia.*

*Ignis su-
cer.*

Comesa-

*Modus
putrefa-
ctionis.*

Arqua - rumpitur atque putrescit. Ad hunc modum
tis super aruatis ac melancholicis affectibus, quoties
uenit fe humor biliosus exuperans in corpore diu-
bris. tius immoratur, febris superuenit. Sæpe etiã
 dispositio in iecore & in splene attulit fe-
 brem, quoties aut inflàmatio aliqua, aut ob-
 structio committit prædictos affectus. Pari
 ratione nec vbi pituitosus humor exuperat,
 febris sequitur, nisi putrescat prius. Atque ob
 hunc quidem, quod ab antiquis existimatum
 est esse impossibile, sæpenumerò visum est:
Rigoris id autem est sine febre rigor, qui nonnullis
circuit? quidem semel accidit, nonnullis autem etiã
 per circuitum pluribus diebus, vel continuus
 ab initio vsque ad finem, vel omninò ita me-
 diocris, vt nequaquàm esse videatur, quoties
 quicuerint, sed vbi moueãtur tantummodò
 efficiat sensum: vel etiam maior, vt etiam si-
 ne motu infestet. Sed quoties talis humor spa-
Febris so cio temporis putrescat, non rigent solùm:
lutu dif- sed etiam febricitant. Et diuturna admodum
ficilis. & solutu difficilis febris in quotidianæ for-
 ma tales affectus sequitur.

De febre epiala qua simul febricitant ac ri-
 gent, ac de humore quem Praxagoras vitreum
 appellauit, & quotnam pituita genera sint.

Hoc genere continetur febris epiala propriè nominata, quoties simul febricitant ac rigent: & utrūque sentiunt, codē tēpore in quavis corporis parte. Sanè Archigenes existimat de nulla altera nomē epialon dici, quàm de vna hac febris. Sed constat Atticos quosdā viros rigore ante febrē ita appellare. Enimvero Praxagoras videtur mihi appellare vitreum, humorem talem. Recentiores autem, è quibus Philippus est, crudum simpliciter, nullum adijcientes vocabulū ad exquisitam definitionem. Is profectò ex specie pituitosi humoris est: vt qui admodum frigidus atque humidus sit. Quisquis enim humor frigidus simul & humidus fuerit, sub ipsam phlegmatis, id est, pituitæ cadit appellationem, si quis Hippocraticè & ex omnium consuetudine non solū veterum, sed etiam aliorum scriptorum nominare voluerit. Prodicus enim libro de naturā hominis prauè nominat, errans circa tale vocabulum ipsa demiranda etymologiā adductus. Sed non est præsentis temporis ad talia deflectere orationem, cum aliam dicamus illis disputationē. Ergo rursus ad institutū veniamus. Quisquis in corpore humor fuerit frigidus & humidus, ipsi hūc nominamus pituitā: tu si libet appellabis scindapsum. Adcò sanè nulla mihi vocabu-

*Epiala
causa.*

† γλυ-
χρός, id
est, levis.

*Pituita
quid.*

- lorum est cura. At verò scias huius humoris plures esse differentias. Nam vna quidem species eius est admodum frigida: ita ut maximos dolores adferat, quum in locum calidum impacta est. Et sæpenumerò multos dolores eorum qui colici dicuntur, ex acri clysmate tali humore euacuato, statim sedatos intueri licet. Hic autem humor videtur similis aspectu vitro fuso. Altera verò species pituitæ est, quam excreantes sæpe expuunt qui Phlegma dul- dam sensibilem obtinens dulcedinem. Constatque eam nequaquam posse esse omninò frigidã, si recordamur eorũ quæ libro de simplicium medicamentorũ viribus docuimus.
- Phlegma acidum. Tertia præterea species alia pituitæ est, quæ ipsis expuentibus acida sentitur, ac minùs quàm vitrea, magis quàm dulcis frigida est. quemadmodum altera falsa habetur, aut ob putrefactionẽ, aut ob permixtionẽ falsæ ferrosæ humiditatis: ex qua febricitantes minimè rigent, sed horrèt tantumodò, præhendente accessione. Acida autem ac vitrea si moueantur, per corpora sentientia permeans, infert Rigor si ne febre. rigore sine febre. Quòd si qua putredo morderata illis adfuerit, epialam cõmittit febrẽ.
- Febris epiala. Sin magis putrescat, rigor præuenit: febris ipsa subsequitur, deuicto frigore ab ipsa multitudine caliditatis, ita ut nullo modo existat per incrementa & vigores accessionũ. At verò

rò vitrea pituita forsitan acidæ qualitat^{is} *Pituita*
 particeps est: ita vt omnes eius differētię tres *vitrea.*
 existant: acida, dulcis, salsa. atque ex pituita *Pituita*
 dulci putrescente rigor minimè antecedit fe- *tres dif-*
 brem. forsitan verò neque simpliciter, neque *ferētia.*
 à simplici causa quis existimarit tales fieri *Rigor ex*
 febres. Siquidem quicquid pituitæ putrescit, *pituita*
 accendit febrem: reliquum nondum putre- *dulci.*
 scens, ex quo rigent non eiusdem est qualita- *Rigoris*
 tis, cum ea quæ putrescit. Si igitur ab hac qui *in febre*
 dem rigor, à putrefacta verò febris efficitur, *tertiana*
 duplex semper causa erit. Licet verò hīc dice *causa.*
 re febrem ab altero quidem fieri causę gene *Tertia-*
 re, rigorem autem ab alio: vt qui nō sit, quod *na quo-*
 febris. Per febrem tamen tertianam flaua bi- *ridiana*
 lis & rigorem efficit, & febrem. Sed hæc logi *implexa*
 cæ magis sunt considerationis: nos ad institutu *Hic ini-*
 tum nostrum redeamus. Permixta pituita pu *rium aliq*
 trescente, ex qua fieri quotidianā docuimus, *faciūt. 7-*
 cum bilioso humore efficiente tertianam, cō *cap.*
 posita duplex quę causa & dispositio fuerit. *Tertia-*
 Alter enim humor vno quoque die, alter ter- *na quoti*
 tio quoque die cōmittit accessionem: ita vt *diana cō*
 vnus dies duas habeat accessiones: alter verò *fusa.*
 vnā, quū tempora accessionis in easdem *Febris*
 horas minimè incidūt. Vbi enim incidant, *tertiana*
 vna erit confusa, neque tertianā, neque quoti- *& quo-*
 dianā exactam speciem seruans. Et quoniam *tidiana*
 vtraque febris duplex est, implexus quatuor *duplex.*

E 4 erunt.

erunt. Vnus, in quo tertiana permiscetur quotidiana: secundus, in quo tertiana permiscetur continua: tertius, in quo permiscetur quotidiana tertianæ continua: quartus autem, in quo permiscetur quotidiana continua tertianæ continua.

Accessiones implexarum febrium

Quot modis fieri conueniat implexus febrium ex quibus æger minimè deducitur ad integritatem.

CAP. VII.

concurrentes. Non concurrentes

Accessionis species. Accessionis tertianæ natura.

Hic horæ distinctio diei facta hora sexta matutina.

CAETERVM vniciusque dictorum implexuum differentia duplex est. Interdum enim omnes accessiones eodē tempore simul inuadunt, quandoque diuersis temporibus accessiones præhædunt. Sed hi cognosci facile possunt, præterquam quod sæpe intermittēs minimè cognoscitur à parim exercitatis: quoniam ægri nūquam deducuntur ad integritatem, sed oportet speciem considerare accessionis, quemadmodum secundo libro de iudicio satis dictum iam est, & inde cognoscere, nō ex ipsa circuituum proportionē. Subijciatur enim venisse cuiuspiam circa horam primam, accessionem simul cum rigore, qui videatur vulnerare carnem laborantis, deinde omnia alia tertianæ febris indicia usque ad vigorem processisse: cum vomitu bilis simul cum sudore benigno inclinare, atque esse iam dici horam nonam.

Porro

Porro cōiectare nos ex toto accessionis mo-
 tu, circa vndecimam horam sine febre fore
 agrotum, ea scilicet integritate quam in cir-
 cuitibus nominare solemus. Ita verò speran-
 tibus statim subsistere sudorem, aut densara
 solūm, aut etiam inhorrescente cute. Deinde *Accessio*
 initium, atque incrementum, & ad hæc vigo *pituito-*
 rem in genere continuæ febris pituitosæ *se-* *sa conti-*
 qui duplicem profectò ita cognoscemus cau *nua.*
 sam esse ac speciem febrium, mixtâ intermit *Tertia-*
 rente cum continua. quamvis nulla inuenia- *ne inter*
 tur intermissio. Ac sequēti quidem die spera- *mitten-*
 mus præhensuram accessionem hora nona. *is cū cō*
 & si vt expectabamus res ipsa eueniat, peni- *tinua pi*
 tus tertio die similiter sperabimus adhuc fe- *tuitosa*
 bricitante agroto, iterum præhensuram eum *nota.*
 tertianæ febris accessionē hora prima. Quod *Præsa-*
 si præueniat, aut cunctetur accessio, quam se *giēdi mo*
 cunda die sperabamus fore hora nona, atque *du.*
 ea quam tertio die credebamus futuram pri-
 ma hora: non etiam posthac sequentibus die-
 bus. neque nonam horam, neque primā expe-
 ctabimur, sed tantò prius aut posterius, quan-
 tò proportio primæ circuituionis accessio-
 nem præuenisse ab hora qua initio cepit, aut
 tardasse, indicauit. Vtra verò earum desitu- *Species*
 ra sit prius, tūm ex febris specie coniectan- *febris de*
 dum est, tūm ex ipsa accessionis longitudi- *sinētem*
 ne, & magnitudine, & more, & motu, & item *indicat.*
 cir-

Lege cō- circuituū repetitione, & anticipatione & tar
mē. aph. datione, & adhuc indicijs quæ postea appa-
12. lib. I. rent cruditis & cōcoctionis totius morbi,
Accessio quorū in vrina maxima censentur. Ac de his
nis acci- omnibus libro de iudicijs satis dictum est.
dentia. Quod si pituitosa continua nequaquam ad
Circui- nonam horam, sed quintam aut sextam exci-
tuum ra piat intermittentem biliosam, quæ prima ho-
tio. ra incepit, adhuc difficilior cognitu est vul-
Vrina est go isti medicorum, quibus talis consideratio
crudita minimè curæ est, an scilicet sit vnum febriū
tis conco gentis quod infestat, an duo, & quodnā utrū
ctionisq; que sit. Cæterum tanquā nihil horū cogno-
potissi- scientes, non solum nesciunt quonam modo
mun in oporteat curare eas quæ nequaquam cogno-
dicium. cuntur qualesnam sint, sed neque utrū secun-
Pituito- da die suspectas habere conueniat utrasque
sa conti- horas, quæ prima die accessiones attulerunt.
nua sim Ego nāque (scio) visus sum eis sæpenumero
plex & vaticinando potius quā præsentiendo, vt
permista medici solent coniecisse initium accessionis.

*Permisceri inuicem febres, scilicet tertianam
 exquisitam & quotidianam: & quonam modo
 Agathinus errauerit circa semitertianam.*

CAP. VIII.

Feb. quo **P**ER hanc igitur mixtionem (de qua nūc
tidiana. agimus) tertianæ cum ea quæ quotidie
 accedit, vidi interdum circa primam horam
 præhen-

prehendere accessionem exquisitæ tertianæ,
 circa sextam autem existere accessiōē eius,
 quam recentiores medici propriè nominant
 ἡμετερον, id est, quotidianam. Solēt enim
 ita nominare febrem quæ singulis diebus ac-
 cedit, nequaquam desinens ad integritatem.
 Ipse verò solitus sum talem nominare ἀμφο-
 μετερον συνεχῆ, id est, quotidianam continuā.
 nomē enim ἡμετερον, nequaquā licet in-
 venire apud quæquam Græcorum scriptū,
 sed ἀμφομετερον appellant, rem omnem quæ
 singulis diebus similiter fit, sed vt Plato di-
 xit, contemnere oportet nomina eos quibus
 tantarum ac talium rerum proposita est con-
 sideratio. Appelleretur igitur, gratiā clarioris
 doctrinæ, ea quæ singulis diebus accedēs de-
 finit ad integritatem, quotidiana simpliciter,
 nihil insuper addendo ei per orationē: ea ve-
 rò quæ minimè definit, quotidiana cōtinua:
 ac liceat tibi, si libeat, alteri adijcere, intermit-
 tens. Pari ratione dicendum, & de ea quæ ter-
 tio quoque die accedit. Altera enim differen-
 tia tertiana simpliciter, vel etiam intermit-
 tens tertiana habetur. altera tertiana conti-
 nua est. Licet verò & continuam tertianam
 nominare tertianam simpliciter, sine adie-
 ctione vlla: quemadmodum nonnulli appel-
 lant. Sed enim non opus est fusiùs disputa-
 re de nominibus: sed redire ad institutum.

ἡμετερον
 civos.

Quoti-
 diana cō-
 tinua.

ἀμφομετερον
 civos.

Simplici-
 ter quo-
 tidiana
 quid.

Quoti-
 diana cō-
 tinua.

Tertia-
 na sim-
 pliciter,
 vel ter-
 tiana in-
 termit-
 tens.

Tertia-
 ne cum
 quotidiana
 im-
 plexa hi-
 storia.

Nam

† π κ ρ η Nam adolescens in quo dixi implexum ex-
 πολ υ μ , tuisse tertianæ cum quotidiana continua ,
 et multū primā quidem die mane incepit cum rigore
 η , γ α σ ρ ο s tertianæ proprio febris , alia omnia seruans
 δ λ ε χ ω - exquisitæ tertianæ indicia vsque ad sextam
 ρ η σ ι ρ ι κ α horam, subitumque vomitum biliosum, † ac
 ν η μ κ ρ η paruum sudorem, à quo statim † contractus
 τ α υ τ η ρ est atque inhorruit homo: deinde rursus præ
 χ ο λ ω - hendente accessione, pulsus erat parvus &
 δ η & c. inæqualis: post vsque ad horam vndecimam,
 & ven. succensa adhuc paulatim, pleraque ipsius ac-
 tris ex - cessionis habebat propria: pauca verò quæ-
 cretione piam ipsius quoque incrementi : deinde vi-
 biliosam que ad noctis horam quartam incrementum
 satis mul † diligens erat , post in eadem magnitudine
 tam in permanebat ad ipsum quidem sensum, vsque
 quibus - ad horam noctis sextam. Vnde iam perspi-
 dam co - cuè videbatur inclinare vsque ad quartam
 dicibus. horam in secundo die. In ea enim contrahe-
 † σ υ ν τ ε σ α batur, atque ipsius accessionis indicia osten-
 λ η , σ υ - debantur, partibus quidem ipsius extremis
 pra di - frigidioribus euadentibus, pulsu autem par-
 xit den - uo: atque increfcebat vsque ad vesperam pau-
 lata est latim, neque horrorem quempiam, nec inæ-
 cutis. qualitatem aliam efficiens : deinde rursus vi-
 † α κ ρ η - gebat circa horam quartam noctis, ac sensi-
 β ι λ . i . ger biliter inclinare incipiebat circa sextam. Ac
 manum quòd quidem tertia die hora circiter secun-
 ac verū. da oportebat eius expectare accessionem
 fore

fore quotidianam, perspicuam erat: non ta- *Initij ac*
 men tertiana, an seruatura esset eandem ho- *cessionis*
 ram, an non, perspicuum erat. Accessio igi- *signum.*
 tur horrida incepit hora secunda, quæ ci- *Accessio*
 tius quàm pro accessione, in prima ac secun- *horrida*
 da die continuæ quotidianæ increfciens vf- *ca.*
 que ad quintam horam, initium rursus alte-
 rum fecit post quintam horam, atque ei erant
 omnia symptomata similia ijs quæ secun-
 da die extiterant. Deinde rursus increfciens
 promptius vsque ad octauam horam, rursus
 horruit in illa hora, ac paulò post accessio
 promptè ascendeat increfciens: ita vt circa
 horam noctis quartam ad consistendi vigo-
 rem deducetur. Ecquidnam aliud quàm
 exquisitæ semiterrianæ hæc accessio extitit? *Exquisi-*
 Cum duæ febres eadem hora inciperent, eo *ta semi-*
 quòd quæ singulis diebus repetebat, duabus *tertiana*
 horis præuenisset: tertiana verò duabus ho-
 ris tardasset. Quocirca nitenti dignoscere *Tertia-*
 speciem febris perspicuè videri potuissent *na cum*
 temperata ac permixta tertianæ, ac continue *rigore.*
 quotidianæ symptomata. Cum enim tertia- *Quoti-*
 na cum rigore incipiat, quotidiana verò sine *diana cū*
 rigore, permixta ex utrisque horrorem sta- *frigore.*
 tim inferebat, rem quidem minorem rigore, *Semiter-*
 maiorem verò frigore: ac tantò maiorem fri- *riana cū*
 gore, quantò minor rigore est. Quapropter *horrore*
 æqualiter distans ab extremis utrisque hor- *incipit.*

Horror ror in medio amborum collocatur, rigoris
rigoris scilicet atque frigoris: id quod téperatis inui-
frigorisq; cem extremis potissimum fieri solet. Ergo nō
medius. ab re nomen tali febris semitertianam indide-
Semiter- runt. Temperata enim ex quotidiana conti-
tiana de nua ac tertiana intermittente, totius suæ na-
nomina- turæ partem dimidiam vtrunque prædictarū
tio. febrium habet. Vt igitur hemionus, id est, mu-
 lus est ac semideus dictus: eodem modo se-
 mitertiana. Mulus enim medietatem quidem
 equi conducentis ei ad generationem, medie-
 tatem verò asini habens, ab altero eorū tan-
 tummodò dictus est. Et semideus, indicatur
 quidem participare dei medietatem: quòd au-
 tem homo sit altera ex parte, omittitur. Itidē
 semitertiana, medietatem alteram habet ter-
 tianam, medietatem alteram quotidianā con-
Semiter- tinuam. Sed duplex modus generationis eius
tiana mo- est, aut enim in vnum tempus duæ accessio-
du- nes concurrunt, vt paulò antè dixi, quia alte-
plex. ra præuenit, altera cunctatur: aut ambæ sta-
 tim ab initio inuicem temperantur. Ac quæ
 quidem ambabus in vnum tempus coeuntibus
 fit, vnam solam habet accessionem natu-
Febris se- ræ ipsius semitertianæ: altera verò, omnes ab
mitertia initio morbi vsque in finē, quæ maximè pro-
ne pul- priè semitertiana ab omnibus nominatur.
chra hi- Sed de hoc paulò pōst agetur, potissimum
storia. propter Agathinum & Archigenem, Adole-
 scenti

scienti igitur quem nostra narratio supposuit, tertio die tali veniente accessione, propterea quod in vnum tempus ambarum febriū accessiones incidissent, præueniente duabus horis quotidianæ ipsius accessione semper, tertiana autem cunctante semper duabus, accessio quarta die incepit, oriente sole speciem seruans exactam febris pituitosæ. Futurū autem ex proportionē erat, vt quinta ab ea accessio inciperet circa decimam horā noctis, quoniam semper præueniebat horis duabus ab initio: tertia autem accessio febris biliosæ habitura principium erat quinta die, hora quarta, ita vt medium interstitium initij duarum accessionū foret sex horarū. quod etiam factum est, circa decimam horam quartæ noctis incipiente accessione secundū speciē pituitosæ febris: atque ita procedente vsque ad horam quartā diei, coeunte verò cum biliosa simul modico rigore, deinde rursus permixtā speciem habente accessione secundū biliosæ simul ac pituitosæ speciem. At verò subsequenti nocte circa octauam horam pituitosa febris incipiens exquisita ac sola, totam obtinuit sequentem diem, quæ sexta fuit: nūm autem vsque ad mediā noctem inclinās, inde rursus incepit eodē modo. Postea reliquā noctis medietatem, & tempus vsque ad meridiem septimæ diei obtinēs, iam quodāmodo incli-

inclinauit. Sed tertiana ei successit cū rigore incipiens, quemadmodū solet incipere exquisita tertiana: atque alia omnia eodem modo exquisita afferens indicia, bilis vomitum effecit, & deiectionē biliosam, & vrinam bonam, & quendam madore crepusculo vespertino, indicans perspicuē ijs qui didicerūt cognoscere genera febrium, quōd remitteretur, atque inclinaret, & soluenda esset post vnā, vel (cū tardissimē) alteram circuitiōnem. Etenim inclinatio facilitatem habuit mirabilem quandam, & qualem nulla ex prioribus, vsque ad horam noctis quartam. In illa enim febris pituitosa singulis diebus accedens, horis autem duabus præueniens, incepit, atque occupans totam noctem, & totum sequentem diem, rursus incepit octaua nocte, secūda hora: quam quidem noctem totam occupās inclinauit sequenti die nono. Accessio autem tertianæ erat futura in illa die circa octauā horam: quoniam duabus horis cunctabarur. Sed tunc circa horam nonā incepit, indicans adhuc eo suam inclinationem. Sole autē occidente coiuit cum ea accessio pituitosa, anticipado innadens, quemadmodū solita erat: & noctem occupans illam, & sequentem diē, rursus incepit decimo die, hora decima. Dein rursus vndecima die hora octaua exactē permanens pituitosa: deinde circa horam noctis primam,

primam, initium horrificum tertianæ febris quatuor horis tardantis extitit. tùm autem sexta hora noctis venter deiecit biliosa, & quidam in toto corpore sudor extitit: & post hæc tota inclinatio prope integritatem deuenit, atque erat iam perspicuum tertianam defuisse integrè, pituitosam autem esse relictam solam iam & inclinantem. Has igitur ob res circa duodecimam diem, nec insuper accessio preuenit horis duabus, quæadmodum antea solita erat: sed septimâ hora incepit deinde circa decimamtertiam haudquaquam sexta: sed tardauit, ac septima hora incepit, ostendens insignem facilitatem atq; inclinationem. Quartodecimo autem die inclinatio multò melior extitit, atque accessio incepit hora nona, & in vrina insigne concoctionis indicium apparuit, prænuncians fore solutionem futuro decretorio, sed de hoc nunc non est sermo, nisi obiter. Quod autem sæpenumerò permisceantur diuersi generis febres medicorum vulgus latentes biliosæ scilicet pituitosis, itemque continuæ intermittentibus, præscriptus ægrotus abundè indicauit.

De differentia semiteriana. CAP. IX.

SEd cùm de his † satis dixerimus, ad id † τὰ ὑ-
 quod paulò antè promissimus, rursus ve- νότα.
 G. nia.

*Tertia-
nae cum
quotidi-
ana con-
tinua p-
mixtio
triplex.* niamus. Composita enim ex tertiana & quo-
tidiana continua (quam vocamus semitertia-
nam) vel habet flauam bilem exuperantem,
proindeque flauæ bilis symptomata vehe-
mentia: vel hanc pauciorē, pituitam verò
copiosiorē, proindeque quotidianæ conti-
nuæ parthemata certiora: vel neutrum altero
humore exuperantiorē, sed ambos equales,
quæ sanè exquisita semitertiana est, talis spe-
cie qualem Hippocrates indicauit, scribens

*Semiter-
tiana ex
quisita.*

libro primo epidemion ad hunc modū. Plæ-
rique in hunc modum afficiebantur: Febris
horrida, continua, acuta, in totum minimè
intermittens. Modus autē semitertianæ erat,
diem quidem vnum habens leuiorem, altero
autem grauius affligens, atque ad acutiorem

*Horrida
febris
quid.*

dispositionem increascens. Horridam autem
dixit, non simpliciter febrem incipientē cum
horrore (nam innumeris febribus id accidit,
de quibus deinceps docebo) sed in qua bo-
nam partem accessionis horror occupat alte-
ra duntaxat die, in qua simul inuadunt ter-
tiana ac quotidiana continua. Se quens enim
dies quotidianam tantummodò habet. Quo-
circa prima dies magna ex parte permixtam

*Semiter-
tiana ex
quisita
accessio.*

ex utrisq; febrem committit: secunda autem
continuum quotidianam. Interdum enim pri-
ma die incipere pituitosam, secunda autem
vtranque contingit. Accessio igitur commu-

nis ex vtriusque quoties æquales fuerint humores, talis est, qualem paulò antè descripsimus semitertianam. Vbi verò tertiana exuperat, febris magis horrida est, & aliquid vigoris in accessione assumit. Statim itaque calidior talis est atque ardentior, ac celerius peruenit ad consistendi vigorem: & item quandam bilis vomitum: vel deiectionem, vel madorem infert. Vbi verò humor pituitosus exuperet, frigus extremarum partium exuperat, & horror parvus est, & pulsus † contractio fortior ac diuturnior est, ac lentè accessio increpsit, & multo post tempore viget: non tamen sitim efficit, neque ardorem, neque vomitus, neque deiectione biliosa, vel mador per eam existit. Arque huius mixtionis duarum febrium etiam Archigenes ipse in notitiam quandam deuenit, sed confuse & incertè, quemadmodum indicauimus septimo libro quem contra ipsius commentarios de pulsibus effecimus. Existimat enim in semitertiana quandoque exuperare tertianam febrem, quandoque quotidianam: non tamen mixtionem æqualem earum quæ sola semitertianam exquisitam committit, aut cognouit, aut indicauit, sed penitus omisit. Cum enim æquales magnitudine sunt intermittens tertiana & quotidiana continua, initium accessionis cum horrore existit, id enim medium

Semitertiana magis biliosa.

Semitertiana magis pituitosa.

Semitertiane ex mixtionis æquali initium. Horror.

rigoris, perfrictionisq; existit, è quibus alterum tertianæ, alterum quotidianæ continuæ inest. Incrementum verò post initium propter tertianam facîle suscipit caliditatem, atque ad consistendi vigorem festinat: propter pituitosam autem tardum, quantum in ea est efficientem incrementum, inhibetur atq; interruptum. Atque est veluti quedam pugna symptomatum, interdum incalescente ægro, quoties tertianæ calor vehementius agens ad cutem humores effert, detinente autem interdum ac retrahente intrò huius motum pituita, quæ ociosa ac frigida est ex naturâ, ac difficile mouetur, & tardè transmeat. At verò in tali pugna, exuperante frigido humore, contractio efficitur, & horror ac frigus partium extremarum & cutis: ita vt altera accessio rursus incipere videatur. Quòd si calidior exuperante, vniuersim calefiunt, & propè ad vigorem peruenisse videntur. Dein paulò post exuperante pituitoso, egri rursus contrahuntur, refrigerantur & horrent. Idque minimè definit vsque ad consistendi vigorem, qui maturius quàm pro pituitoso humore, tardius quàm pro bilioso existit: quoniam pituitosus detinet biliosi celeritatem, biliosus tamen tarditatem ac segnitiam pituitosi accelerat. Atque huiusmodi quidem exquisita semiterriana est, ex æquali temperamento.

dua-

Symptomatum pugna.

Pituita ociosa.

Accessio nis repetentis accessio.

Incrementum semiterriana.

Vigor semiterriana.

duarum febrium & duorum humorum effecta. Ea verò quę minimè exquisita est, vel humorem biliosum, vel pituitosum obtinet ampliore.

Semitertianam esse febrem continuam, nec unquam deduci ad integritatē: sed errasse Agathinum, vocantem semitertianam omnē febrem diuturniorem. CAP. X.

AT verò secunda implexio ac mix *Tertio* est duarum febrium tertianę & *na* & quotidianę, sub similem efficiens *quotidia* accessionem predictę: sed differētia impletem eo quòd hæc deducatur ad integritatem, *xio secūda* & quòd secunda die, vel cum horrore vel rigore quotidiana sola effecta, incipiat. Quocirca talis febris non insuper semitertiana censetur: siquidem semitertiana continua censetur. *Semitertiana est cōtinua.* Si verò in altero genere febrium eam annumeremus, non solū talis, sed etiam alię quędam febres nominabuntur semitertianę. Ob eam rem mihi videtur Agathinus omnes productas tertianas, appellare semitertianas. Sed enim cū de nominibus potius quàm de rebus tales quęstiones sint, immorandum in eis minimè cenſeo. Nam alio libro scosum de vocabulis medicinalibus dictum iam est: in quo id ostenditur ac definitur in plenum, quęnam

Semiter- sint de rebus, & quænam de nominibus con-
tiana fe trouersæ. Quocirca rursus ad res ipsas re-
bris qua deamus, semitertianam ab Hippocrate nomi-
dicenda natam horrificam & continuam, quam ter-
fit. tiana quotidianæ continuæ permixta com-
Horrisi- mittit: intermittenti autem, minimè efficit:
ca acces propterea quod febris ex utraque composita, ne-
sio. cessariò & ipsa intermittens existit. Neq; ve-
 rò ex duabus continuis, biliosa scilicet ac pi-
Ingemi- tuitosa, fieri potest semitertiana, neque enim
nationes mixtio horrificam faciet febrem, neque mul-
Duarū tas ingeminationes habentem. Quum enim
cōtinua- omnis continua febris suapte ratione, quum
rum im- exquisita est, neque habeat horrorem, neque
plexio rigore: neque etiam febris ex eis composita,
tertia. horifica erit. Oportet ergo si eadem futura
Horrisi- sit horifica simul ac continua, generationem
ca febris. habere eam ex duabus febribus: altera qui-
 dem intermittente, altera autem continua. Et
 ob eam rem tertiana permixta quotidianæ
Tertia- continuæ, committit semitertianam: neque
na conti ambæ intermittentes, neque ambæ continuæ
nua & possunt committere talem febrem. Restat igitur
quotidi- una mixtio quæ ex quotidiana intermit-
na inter tente, ac biliosa continua constans, potest
mitten- continuam simul atq; horrificam committe-
ris imple re febrem. Sed hæc contrà quàm prima, ha-
xio quar bebbit continuitatem quidem ex biliosa, hor-
sa. rorem autem ex pituitosa, atque ingemina-
 tiones

tines ex pugna mutua, maximeque quoties humores ipsi faciant æquales. Vincentis vero eorum alterutrum ex symptomatis agnitione in prima missione declarata est. Hæc omnia de quatuor missionibus biliosæ febris ac pituitosæ, magis propria sunt libro qui est de typis: sed hic necessario dicta sunt propter semitertianam: cuius generationem Archigenenes ad tertianam quotidianamque retulit; nequaquam videns se intermittentem efficere febrem. Agathinus verò perspicue confessus est eiusdem generis esse cum tertiana semitertianam, disidentem tantummodò magnitudine accessionis. Si igitur omnes febrium differentias accuratè persequuti, lapsi nominibus essent, fuisset id ferendū. Sed cum neque simplicium, neque compositarum omnes scripserint differentias, & ad hæc quasdam alias superuacuas adiecerint, nihil neque iam præensionem, neq; in curationem iuuantes, nos conati sumus pro viribus diligenter excollere omnem typum, longo tempore, ex usu simul ac ratione, viles in eo differentias peruefligantes. Simples ergo ad præsentem attinent librū: implexæ autem ex his, attinent ad librū de typis, cuius penitus ignarus non eris, ubi hunc diligenter euolueris. Ex ijs enim que diximus de febre pituitosa ac biliosa inuicè penmixtis, licebit hæc ad atram bilem transfe-

Melancholicarum imple - xis.

Imple- rentes, de implexu cum vtraq; earum ac tem-
us qd. peramento coniungere: implexum nominan-
Tēpera- tum, vbi diuersis horis incipiant: temperamen-
mentum tum, vbi initium eodem tempore fit. Nec se-
quid: cus tres febres implicare ac temperare quis
per se ipse poterit sumpta ratione de prædi-
dictis. Horum enim omnium initium, fons
& elementum est, diligenter internoscere cu-
Febris iusque simplicium febrium speciem. Neque
species: enim magnus numerus earum est: sed omnes
tres existunt, biliosa, melancholica, ac pitui-
tosa. quarum cuiusque duplex differentia est,
intermittens & continua, ita vt omnes simpli-
ces differentię febrium ex humoribus putri-
dis consistentium sex numero sint. Quod si
qua alia illis accesserit, in his particulatim dif-
ferentia ex copia humoris, quantitate & qua-
litate putredinis, necnon modò motus, & par-
te in qua putrescit, generationem habebit.

Quo pacto erret Agathinus, appellans febrem
omnem semitertianam, cuius accessio plurimum
producat. CAP. XI.

C A P. XI.

Exquifi-
ta tertia
na, eius-
q; nota.

Q Vale hoc fit quod iam proponatur ex ijs febribus intermittentibus quæ tercio quoq; die infestant, cui quidē & accessioneis tempus breue est, & initium cum rigore, & solutio cum sudore ac vomitu bilis, vel etiam inferna

ferna alno deijciente biliofa: hunc nomen in- *Tertia-*
ditum est exquisita tertiana: cui verò aliquid *na nō ex*
horum deest, non amplius exquisita, sed fim- *quisita.*
pliciter tertiana vocatur. Quod si & inter- *Tertia-*
missione minorem hebuerit, productā scili- *na pro-*
cet accessione, tertianā hanc nominant pro- *ducta.*
ductam: tametsi hæc maioris minorisque ra-
tione differentiam magnam obtineat. Ac li-
cet hanc quidem absoluto sermone appellare
productam, quæ cum quatuor & viginti ho- *Tertia-*
ras accessionis occupauerit, reliquas sine fe- *na admo-*
bre obtinet: hanc verò admodum produ- *dum pro-*
ctam, cum circiter triginta horas febris pro- *ducta.*
ducitur: & hanc prætereā magis productam, *Magis p-*
cum ad sex & triginta procedit: & hæc aliam *ducta.*
plurimū cum ad quadraginta & eo amplius *Plurimū*
producitur. Sed hæc omnia definire certis *pducta.*
terminis non licet ob † acrualem dubita- *† σωρεν*
tionem. Neque verò necesse est talem nomi- *κῆν ἀπο-*
num subtilitatem quærere, cum liceat nobis *σιαν.*
etiā sine ea indicare ijs qui adsunt diligenter
de vnoquoque ægro, & rectè curare, ac e-
uentum morbi, præsentire. Subijciamus enim
quempiam quindecim horis febricitare, esse *Cibandi*
autem sine febre tribus & triginta, atque id *tempus*
deinceps ei accidere ex proportionem. Sanè ci- *indicat*
bandi tempus certa scientia sumere lice- *accessio-*
bit tum ex accessionis, tum intermissione *nis et in-*
tempore, & quicquid ex eo sumi vtile potest *termis-*
sionis tē-
pore.

ad

Doctri- ad præfensionem & curationem, id quoque
na vera abundè suppetet, etiamsi non queratur ter-
et firma tianamne absolute sermone oporteat no-
que in minare talem febrem, an cum quadam alia
rebus in adiectione definiente ipsam differentiam.
sistit eas Quin & volens indicare alia ratione febrem
ipsas è ægri quanam sit, diligentius indicabit, ac-
natura cessionis & intermissionis dicens longitudi-
ppria de nem, quàm quærens nomen quod perspicue,
ficiam ac definite indicare idem queat. Hæc igitur
degene- optima enarratio, atque doctrina est. Se-
rat quæ cunda autem est quam paulò antè dixi, ex-
neglecta quisitam quandā tertianam nominans, aliam
natura verò simpliciter tertianam, mox aliam pau-
rerū no- lum productam, deinde aliam admodum,
minibus aliam autem magis, postremò plurimum a-
res desi- liam. Sed ex omnibus obscurissima ac pessima
gnat. est, quæ prima est prodita: ob quam re-
sophisti- centiores medici quotidie inter se certant
cè ejusque atque contendunt, ne id quidem cognoscent-
neglectis tes se de nomine cōtendere. Sed de alijs quis
rebus in fortasse minùs mirabitur: de Agathino verò
nomini- magis mirandum. siquidem productam quan-
bus om- dam nominans quotidianam & quartanam,
nes con- in tertiana minimè servavit proportionem:
trouer- sed cuius amplius producta fuerit accessio
stas mo- hanc nominat semitertianam. Sed de nomi-
vet. num ratione hæcenus. nam et ipse plus quàm
 par est temporis in ipsis contero, proinde
 tempus

tempus est, vt ad considerationem aliarum rerum redeamus.

Quonam modo ex sanguine putrefacto febris accendatur biliosa: & quod sanguinis pars tenuior vertatur in flauam bilem: crassior in atram.

CAP.

XII.

S Equens est vt agitetur consideratio nihilò inutilior, vtrum quemadmodum ob vtranque bilem ac pituitam fiunt genera quædam febrium, ita & ob sanguinem putrescentem eueniat. Febris enim diaria, eo tantummodò calefacto (vt diximus) haudquaquam putrefacto consistit. Per ipsam verò putrefactionem (necesse est enim interdum sanguinem putrescere) quærendum febrium ipsarum genus. Id autem inuentum iri par est, si prius inuenerimus quonam modo sanguis putrescit. Constat enim Aristotelem rectè dixisse, fieri putrefactionem ab aliena caliditate. intelligit autem alienam, externam, non natiuam, nec vnicuique rei propriam. Hæc enim concoquere: aliena verò corrumpere solet, quod est putrefacere. Extrinsecus autem caliditas superuenit sanguini per æstum, ac pestilentem constitutionem, & vt summatim dicam, per omnes febres ex quacunque causa in generationem deducantur.

Sanguis

an com-

mittat fe-

brem pti-

tridam.

Ephone-

ra fit san-

guine ca-

lefacto.

Sanguis

putrescit

Putredi-

nis cau-

se.

Calidi-

tas alie-

na.

Calidita-

tis alie-

ne cau-

sa exte-

ne.

Quin-

Interna. Quinetiam ubi in quapiam animalis parte
Putre- sanguis copiosior collectus, supra vires eius
factionis fuerit, corrumpitur: maximèq; quoties infar-
sanguis ctus est ob crassitiè in parvis vasis, aut impa-
nis causa ctus ob copiã. Quemadmodũ accidit in bu-
duplex. bone & phymatis, & vt in summa dicam, in
 omni inflãmatione. Nã in tali dispositione
Pleuri- sanguis duplici ex causa corrumpitur: tũ
ti. quia minimè diffilatur, tũ quia à natura mi-
Reiecta nimè vincitur. Quod autem què minimè dif-
p tussim flantur, putrescere soleant, in cunctis exteris
sanies in corporibus intueri licet, fructibus, seminibus,
pleuriti- atque etiam vestibus: atq; persuadere id quod
de quid dicimus, maximè potest pleuritis. Expuunt
indicet. enim per eam alij spumofam, alij pallidã, alij
Febris ex rubram saniem, quæ nihil aliud est quàm hu-
sanguis moris in inflammatione vincentis pars quæ
ne est ca non continetur, sed præ tenuitate foras resu-
teris sim dat. Interdum etiam talis sanies nigra appa-
plicior. ret, ac neq; statim ab initio, sed processu tem-
Febris ex poris, præcedente magna ex parte pallido
sanguis sputo, quod erat indicium flauæ bilis exu-
ne circui perantis: quemadmodũ spumofum pitui-
tio. tæ, rubrum sanguinis. Quocirca ratione non
Sanguis caret interdum putrescere sanguinem ipsum
vis mu- in locis inflammatione affectis, febremque
tatio in ex eo simpliciore esse quàm ex alijs humo-
alios hu ribus. Proportionem autem accessionum
mores. tertianæ circuitionis potissimum sumit (ita enim

enim fieri cernitur & in pleuriticis quoties
 rubrum expuunt) vbi verò supra modum
 afflatur, mutatur penitus. Pars enim tenuis-
 sima simul ac pinguis in pallidam bilem:
 crassior autem in atram vertitur, quemad-
 modum accidit in carbunculis. Etenim in
 his sanguis vehementer feruescens mutatur
 in humorem melancholicum. Ad hunc verò
 modum inaudire oportet humorem melan-
 cholicum, tanquam nondum effectus sit atra-
 bilis: sed in confinio quodam collocatus. Fe-
 bres igitur consistent pro specie humoris, in
 quem sanguis mutatur, tantummodò dissi-
 dentes malignitate & elementia. Simplicio-
 res enim sunt ex mutatione sanguinis: tum
 ex tera: tum caloris lenitate. Et si enim quam
 maximè multus manus occurfu depræhen-
 datur, prorsus tamen mitis est: quemadmo-
 dum is qui post balnea accidit. Copia enim
 caloris febrilis in ipsa effluuij copia semper
 posita est: molestia verò, si admoueas extrin-
 secus manum, in ipsa caliditatis acrimonia.
 idque erit tibi indicium maximum humoris
 committentis febrem: intelligo autem ipsius
 caloris qualitatem. Qui enim vaporosior est
 atque minùs molestus, sanguis est: qui mole-
 stus, erodensque & mordax, ex bile confi-
 sit. Vbi verò in primo occurfu vaporosus
 potius quàm mordax sentitur, diutius autem
 immo-

*Carbun-
culi.*

*Humor
melanch-
olicus.*

*Febris ex
sanguine
mitior.*

*Caloris
febrilis
copia se-
quitur co-
piam efflu-
uij.*

*Humor
committ-
ens fe-
brem ex
caloris
qualita-
te depræ-
heditur.*

Febris pituitosa si gnium. immorantibus paulatim ei acrimonia accedit, eaque maximè inæqualis, ita vt per colum quoddam vel cribrum transmitti videatur talem febrem ex pituita putrescente consistere sciendum est.

Multa morborum genera repetere per circuitionem, vt ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articulare.

CAPVT

XIII.

Caloris inæqualiter occurrentis causa.

Analogia.

CAeterùm consideranti mihi quæretique causam ob quã febres ex alijs humoribus calorem habent æqualiter occurrentem: quæ verò ex pituita consistunt, dictã obtinent inæqualitatem: apparuit mihi potissimùm causa esse lentor crassitiesq; humoris, & dissolutionis difficultas. Huius enim, vt aliorum omnium, quicquid semper extenuatũ est, per halitum digeritur: vix autem extenuatur, quicquid crassissimum: ac multò minus, si frigidum naturã sit. Quocirca neq; totum nec æqualiter, sed quicquid putredo occupauerit, id solum in flatus vertitur, ac extenuatum foras fertur, ac perinde euenit vt in glutinosis crassisque humoribus externis dum elixantur Existunt enim ex eis bullæ, quibus ruptis spiritus vniuersè educitur, simul secum abducens humorem attenuatũ. Vbi verò tenuis humor elixatur,

tur, neque bullæ efficiuntur, & qui ab eo at-
 tollitur vapor omninò similis ac continuus
 fibipſi eſt, ſed cùm de his ſatis dictum ſit, ſe-
 quens eſt vt agamus de cauſa februm ſyno-
 chorum. Mirum enim mihi eſſe videtur ſæpe
 vſque ad quartum vel quintum, & interdum
 vſque ad ſeptimum diem, vnâ fieri accēſio-
 nem in eis ab initio vſque ad finem. Quan-
 quàm ſi quis conſideret diligenter, magis mi-
 rû eſt quaſdam febres repetere per circuitio-
 nem. Exemplum enim ſupradictû à nobis de
 ſtercore particulatim putreſcente, non per-
 inde poteſt accidere, quàm in corpore ani-
 malis putreſcentes humores cum his qui pu-
 tredine vacant, facilè miſceri poſſint, vtpotè
 quâ ex omnibus confluxus, conſpiratioq; in
 omnia exiſtat. Quocirca minimè fieri poteſt
 vt putredo in vna aliqua parte, aliâs alia fiat,
 niſi inflammatio colligatum detineat inci-
 pientem putreſcere humorem. Cùm igitur
 ratio in contrarium cedat, difficiliusque ſit
 inuenire cauſam februm circuitione repe-
 tentium quàm ſynochorum, de vtriſque nite-
 mur diſſerere, neque hîc producentes ſermo-
 nem, neq; contradicentes erratis aliorum, ſed
 (vt in omnibus antè fecimus) veritatē ipſam
 tantummodo perſequentes, qua nixus poſ-
 ſis depræhendere errata aliorum. Incipien-
 dū igitur ab ijs quæ manifèſtiſſimè apparēt,
 cuiuſmo-

*Hic ini-
 tiū ca. I. 3*

*Cap. 7.
 primus.
 Putridi
 humores
 in corpo-
 re.*

*Morbi p
 circuitu
 repoten-
 tes.*

Ophthal- cuiusmodi sunt ophthalmiæ quædam, quæ-
miæ. rum hæ quidem singulis diebus, hæ autem
Aurium tertio quoque die infestare cernuntur. Nec
dolor. secus aurium dolor & capitis, vel totius, vel
Hemi- dimidij, quem nominant hemicraniam. Nō
crania. nullis verò etiam podagra ac dolor articu-
Pod- laris repetit per circuitionem. Vt igitur in
gra. his omnibus uidere licet venas ipsas in par-
Circui- tibus quæ infestantur in tumorem attolli, &
tiones de phlegmonem augescere, & dolores intendi,
fluxione & fluxionem insignem foras procumbere:
feri. ita existimandum est in partibus internis,
Rōne il- quæ minimè apparent, seruari eandem pro-
la analy portionem. Verbi gratiâ per inflammatio-
tica Pla nem pleuritides, ac peripneumoniæ intume-
to. abijs q̄ scere quidem inter initia accessio num, discu-
oculis v- ti verò ac subsidere per inclinationem. Sed
surpant, quonam modo id fiat fortasse inueniemus,
& exter si ea quæ de inflammationis generatione &
na sunt rheumaticis affectionibus vocatis alibi de-
ad ea q̄ monstrata sunt, ad memoriam reuocaueri-
latet & mus. Si enim simul cum illis adiecero quæ-
internas. cunque propria huic sermoni sunt, præsentibus
inflāma bus quæstionibus sufficient.

tiões gra

dū pau-

latim sa

bus decumbant, & quod partes debiliores prom-

cit, & prius suscipiant excrementa.

hinc ad

febres.

Quam ob causam fluxiones certis tempori-
bus decumbant, & quod partes debiliores prom-
cit, & prius suscipiant excrementa.

CAPVT

XIIII.

Fluxio-

Fluxionem igitur decumbentem in *Oculorū* oculos, omnes quidem concedunt *fluxiones* ab ipso capite defluere, sed quā ex capi-
causa sit ob quam præfinita circui- *te sunt.*

tionem sæpenumerò defluat, dicere minimè
possunt: vt qui nequaquàm commentati sint
in facultatibus naturalibus, de quibus ipsi
tribus libris perſcripſimus, indicantes omnes *Vires na-
turales*
quatuor eſſe, à quibus plantæ & animalia *quatuor*
gubernantur. Vna ergo eſt quæ attrahit pro-

prium alimentum, altera idipſum detinet:
tertia autem ab his alterat: quarta ab his alie-
na expellit. Alienum autem in omnibus re-
bus duplex eſt: alterum qualitate, alterum
quantitate. Id verò propter ſitarum in ipſis
partibus facultatum fortitudinem atque im-
becillitatem colligitur. Nam ſi quidem pari-
bus ſint viribus, & meatus deferentes excre-
menta ſe habuerint ſecundum naturam, par-
tes ipſæ ſanæ ſunt: ſi verò plus quàm alterari
queat aſſumptum ſit, excrementum omne
excerni à facultate expultrice pulſum ne-
ceſſe eſt. Quòd ſi hæc imbecillis ſit, eodem
in loco manere neceſſe eſt. Atque ſi multum *Alienū
qualita-
te et quā-
titate.*

ſit, grauatur eum ipſum, atque diſtendit. ſi acre
ſit erodit & mor det, quemadmodum ſi ca-
lidum ſit, calefacit: ſi frigidum, frigefacit. at-
que hæc perſpicua ſunt in ijs quæ in vètre ha-
bètur. Quidā nanque ingerentes plus alimē-
*Excre-
mentū cau-
ſa.*

ti, interdum vomere coguntur nauseabundi: interdum alui fluore corripuntur. Quod igitur hîc per maxima spacia excernitur cruentantia foras excrementum, id in alijs partibus animalis per tenues meatus non foras, sed ex alijs in alias transfluit partes: expellens quidem fortioribus, suscipiens vtrò debilioribus. Porro rursus expellitur ex his in alias, atq; ex illis in alias defluit, quousque in debilissimas omnium decumbat. Id autem rursus recurrere inde in alias fortiores nequaquam possibile est. Atque ob eam rem per phlethoram ac vitium humorē partes omnium debilissimæ aliâs inflammatione, aliâs erysipelate, vel herpetibus, vel aliquaquam affectione præhenduntur, aut habent affectionem quam rheumaticam nominant, de qua seorsum scripsimus. Quocirca minimè mirum videri debet, cerebrum vel etiam totum interdum caput ubi collegit aliquod excrementum, in aliquam partem debiliore expellere, aut in aures, aut oculos, aut tempora, aut labrum, aut dentes, aut genas, aut palatum, aut gingivas, & gurgulionem, & tonsillas, & adenas ibi contentos: atque ubi nullum ex his fuerit imbecille, in thoracem, pulmonem, fauces, gulam, ventriculum, fluxionem transmittit. Quemadmodum ergo caput sæpenuerò prædictorum cuique

Pletho-
ra.

Humo-
rum vi-
tium.

Partes
debilio-
res.

Fluxio.

Defluxi-
ones ex
cerebro.

Τὸ κεφάλαιον

Caput
variorū
morborū

causa.

causa

causa morbi est: ita inflammationis in iecore & liene, proximarum aliqua partium, aut etiam mehercle, vna longius positarum, vel plures quæ excrementa gignunt, augent, transmittunt, & circuitione affligunt. Ac nihil miri est his accidere affectum simile excretioni excrementorum ventriculi. *Circuitus modus.* Quem admodum igitur si quis videret quidem quantum quotidie excernitur, ignoraret autem causam excretionis, miraretur ordinem: ita qui nescit neque generationis in capite excrementorum, neque excretionis causam, ignorat autem & quamobrem hæc foras decumbant, illa in aliquam aliam partem transfluant: hæret atque miratur influxus proportionem. Pari autem modo, & qui ignorat quæ partes excrementum iocinori transmittunt, miratur proportionem excitatarum ex iecore febrium. At qui nouit decumbentem in viscus fluxionem & primum phlegmones initium dedisse, & sequentis accensionis ipsam partem affectam authorem esse, mirari desinit.

Quonam modo ex calore attrahantur excrementa: & quod dolor omnis irriter fluxiones.

CAPVT XV.

Decursus humorum duplex causa.
Cacterum duplex causa est huiusmodi influxus humorum, vna quam proximè indicauimus, quoniam ex alijs partibus in alias.

H 2 debi-

debiliores excrementa transmittuntur: altera verò, quoties attrahuntur, de qua hoc loco *Partis su*
scipietis agendum, initio sermonis petito ab ijs quæ
imbecilli omnibus conspicua confessaq; sunt. Si enim
tas. tapfiam illinas cuiquam, videbis paruo tem-
Partis su pore partem huic esse calidiorẽ, atque in
scipien- tumorem non paruum attolli. Nec secus si
tis attra foueas partem quampiam iuxta ignem, aut
elio. fortiter frices, aut vngas resina, aut pice modicè calida, deinde paulò pòst euellas vniuer-
 sim, aut si etiam vngas partem quopiam me-
 dicamento calido. videbis enim ex his om-
 nibus ipsam attolli in molem: quia calor ip-
 se, vel ad se trahere, vel suscipere soleat fluxio
 nem. Verùm necesse non est in præsens talia
 definire, id quod vrile est instituto iam ha-
 bentes, etiam sine huiusmodi contemplatio-
 ne. Semper enim in partes vehementius ca-
 lescentes decumbere fluxio videtur: vbi cor-
 pora plena sunt, atque abundant excremen-
 tis, admodum larga: vbi vacant excremen-
 tis, pauca. Decumbit prætereà maximè & in-
 dolentes. Sic nanque sæpe cui summus digi-
 tus manus minima acu punctus est, statim
 dolet, & paulò pòst partes quæ circiter sunt
 inflammatione laborant, atque in molem
 maximam tolluntur. Quibusdam verò etiã
 bubones sub ipsis alis erupunt, vbi accepe-
 rint aliquid fluxionis rara et spongiosa quæ
 ibi

ibi habentur corpora, quos Græci nominant
 adenas. Quibusdam autem accidit id in me- *Adenes*
 dio brachio ubi insignis aden ea parte exte- *quid.*
 rit. Perspicue id quod dicimus videre li-
 cet, quoties vlcus aliquod exiguum sine in-
 flammatione ac dolore prope vnguem fue-
 rit. Si enim hoc contemnatur, neque coeat,
 & ad cicatricem deducatur, innata ipsi caro
 ab vngue pressa primum quidem dolet, de-
 inde totus digitus, aliquando verè & eorum
 corpus, & interdum manus vel pes ita maxi-
 mam deducitur inflammationem. Ita igitur
 dolor attrahit in dolore affectas partes flu- *Dolor at-*
 xionem, non tamen causam huius hinc dicere *trahit.*
 oportet. Alibi enim commodius est dicta,
 nec illius in præsens indigemus. Videtur er-
 go iam causæ fluxionum ex ipsis partibus *Fluxio-*
 laborantibus fluxione ortæ esse duplices. *nū causa*
 Vna ex calore qui in eis accenditur: altera *duplex.*
 ex dolore qui superuenit. Causa autem cur *Calor at-*
 aut plus, aut minus, aut benignius, aut dete- *trahit.*
 rius influat, est non in ipsis solum partibus *Dolor at-*
 laborantibus fluxione: sed cur benignius de *trahit.*
 teriusve influat, in ipsis partibus mittenti- *Maiori*
 bus causa est: cur autem plus minusve, in vtri- *fluxionis*
 que. Calor enim fortis ac dolor, plus debi- *causa.*
 lior, minus attrahit. Itidem corpora excre- *Excre-*
 mentis vacua exiguum quiddam trahenti- *mentosa*
 bus mittunt: excrementosa autem ac ple- *corpora.*

thorica tantò plus mittunt, quantò ab ipso naturæ habitu longiùs recesserint. Atque hæ quidem fluxionum differentiæ sine debilitate partium fluxione laborantium existunt.

Debilitas recipientium. Aliæ verò & ob harum debilitatem, ac fortitudinem mittentium excrementa, efficiuntur. Omnis enim inflammatio sine vulnere ac collisione præhendens partem, excrementis quibusdam decumbentibus ex fortioribus in debiliora existit. Talis autem *Fortitudo mittentium.* inflammatio statim accendit febrem, quoties ob magnitudinem, aut vicinitatem calor ex ea ad cor pervenerit. Decumbentia igitur excrementa in omni inflammatione putrescunt propter causas prius dictas. Nec similiter omnia putrescunt, eo quòd quædam sunt pituitosa, alia melancholica, nonnulla biliosa. *Febris ob inflammationē fluxionis.* Ipsis autem putrescentibus accenditur calor præter naturam in parte inflammatione affecta: simul quidem calefaciens quæcunque primæ tangunt inflammatione obseſſas partes, deinde illis continuas, ex quibus rursus aliæ ratione vicinitatis calefactæ, rursusque aliæ ab illis vsque ad ipsum cor defertunt interdum caliditatem. Sed quænam sit dispositio in parte inflammatione affecta, diximus in libro de intemperie inæquali: & item in libro de tumoribus præter naturam. Quòd autem necesse

Putredo accendit calorē.

ceffe fit contentum in ea sanguinem putre- *His cum*
fieri sæpenumero, simul cum materia quæ in- *excreme*
fluxit, in hoc dicitur. *tis putre*
scit.

*Colligi excrementa diuersis temporibus, quæ
sæpenumero ordinem minimè seruent, atque
esse quandoque breuem, quandoque longam
accesionem.*

CAPVT XVI.

EXcrementum igitur quod decubuit *Excre-*
ex vna parte in aliam, interdum *mentum*
adeò multum prauumque est, vt par *defluens*
tis laborantis fluxione lædat vires: *duplex.*
interdum adeò mite ac exiguum, vt susci-
piens corpus minimè offendar. Si igitur *Vires e-*
adeò debilitet vires vt exoluantur, nec præ- *xolutæ.*
tereâ euincant ea quæ priùs vincebant, *Putrefa-*
tunc sanguinem putrescere necesse est du- *ctionis*
plici ratione: & quia humor minimè cui- *duplex*
ctus à calore proprio reliquam habet in pu- *causa.*
tredinem mutationem: & quia simul cum
excrementis putrescentibus putrescit. Sin
non tantum lædat vires vt exolutæ penitus
quiescant, semiprauus & tanquam semipu-
tris, in tali constitutione sanguis efficitur: *Sanguis*
vicinitate quidem putrescentium excremen- *semipu-*
torum simul putrescens, persistens tamen in *tris.*
sua ipsius natura quantum est in ratione
H 4 facul-

† Signo. facultatis ipsum † conficientis. Vtunque autem se res habeat, accensus calor per primam putredinem penitus acrior ac mordacior est quam foret dum per naturam haberet, atque mordax. tantum crescit, quantum in natura ipsa excrementorum sufficiat. Hæc enim talem habent

Analogia. proportionem ad calorem ex eis accensum, qualem ligna ad ignem obtinent. † Hæc tamen minimè in infinitum tempus sufficiunt ad alterationem: sed terminus alterationis ipsis est, humoris innati consumptio. nam eis codicisque cremari queunt, dum innatum habuerint humorem: atque eo consumpto cremari desinunt, ac reliquæ eorum nominantur cinis. Quinetiam putrescentium humorum similiter calor permanet dum prorsus sint assati. par est autem reliquias humorum terrestres exiguas esse nequaquam multas, quemadmodum lignorum: propterea quod

Humorassa. in substantia eorum elementum humidum exuperat, non ficcum. Simili modo si libeat coquere humorum externorum quempiam,

Humorum reliquia. ut oleum aut vinum, terrestre quidem eius qui minimum relinquetur, reliquum autè totum extenuatum, in vaporem atque aërem

Analogia. discedet. Itaque tota substantia feruefactorum humorum ex putredine extenuatorum ab ipso calore in ambientem dispergitur per vigitationem canrem, inclinationemque febrium. Remanet autem

tem

tem iam excrementum omnino exiguum, vel *Excre-*
 nullū: in humoribus quidē crassioribus exi- *mentum*
 guum, in serosioribus autem nullum. Quod *paucum*
 si nulla debilitas extiterit virium partis in- *interdū*
 flammatione laborantis, nec rursus mittan- *nullum.*
 tur excrementa: & morbus solutus est, & *Morbi so-*
 posthac haud iterum febricitauerit homo, *lutio.*
 neque sequenti die, neque tertio quoque die, *Secunda*
 neque quarto quoque. Quod si ob eandem *accessio-*
 causam mittantur excrementa ob quam ab *his cau-*
 initio parti mittebantur, aut si hæc quidem *sa.*
 non amplius mittantur, sed permaneat vi-
 rium debilitas: denuò febricitare hominem
 necesse est. Subijciatur enim primum, facul-
 tas partis robusta, tempore verò interuenien-
 te eisdem in partibus quæ prius transmise-
 rant, collecta esse excrementa paria quanti-
 tate & qualitate his quæ initio transmissæ. *Circui-*
 Hoc verò accidit his in quibus dispositio mit- *uum or-*
 tentium, & attracti ad ipsas alimenti quan- *dine re-*
 titas & qualitas eadem permanet. Necesse *petentiū*
 enim est, æquale ac simile quod ab eadē alte- *causa.*
 ratur facultate, æqualia ac similia facere ex- *Impedi-*
 crementa. Quinetiam tempus collectionis *quia.*
 eorum necessario æquale erit. Partes enim *Ex pul-*
 quæ aluntur quoad similem habuerint con- *tricus fa-*
 stitutionē ab eodem nutrita alimento, æqua *cultatis*
 lia quantitate & similia qualitate, atque co- *incita-*
 dem temporis tractu colligent excrementa, *menta.*
 Quin-

Quinetiam eadem circuitione incitantur ad expellenda ea. atque mittenda debilioribus. Siquidem tunc primum expellendi facultas excitatur ad operationem suam, ubi grauaturs multitudinc excrementorum, aut qualitate molestaturs. Sed de his omnibus in commentarijs de viribus naturalibus definitum iam est: in quibus exercitatum esse conuenit eum, qui quæ nunc dicuntur, sit cum demonstratione intelleturus: magno quidem præmio ipsi proposito ex tali contemplatione ad curandi viam & rationem. Nam vt alia omnia omittam quæ sum dicturus in eo libro vnus tantummodo faciam mentionem, quod maximè quidem in promptu est, quodque ipsi sæpenumero fecimus,

Ophthalmia per circuitum repetēs. ophthalmiæ scilicet per circuitionem repetentis. Spero enim id non paruum incitamentum fore lestoribus ad eam quam hoc loco tradimus condiscendam doctrinam. Contrà enim quàm ij qui se nominant ab oculorum curatione ophthalmicos, curauimus semper huiusmodi ophthalmiam. Nam cum illi semper oculis negotium facerent, nos interdum purgatione, interdum balneo, interdum meri potione (vt Hippocrates dicit) interdum sanguinis missione, interdum vtriusque, vel clistere cum sanguinis missione vsi sumus:

atque

atque interdum statim his adhibitis defuit, quandoque etiam ubi capiti fuisset prospectum. Omnes enim qui ita curati sunt, aut omnino accessionem non habuerunt, aut semel solum: sed multo leuiorem quàm prius. Sed de curatorijs discretionibus ac de indicijs, nequaquam est hoc loco agendum. Cæterum quòd accidat interdum totum caput aut minimè affectum, sed sanguine prauo atque excrementoso nutritum, colligere excrementa plura ac vitiosiora quàm antè, ita vt nequaquam eis sufficiant naturales effluxus ac perspiratus, sed cogatur natura expellere excrementum ad aliquam partem debiliorè, aut si humores secundum naturam se habeant, ipsum autem affectum sit, aut etiam ambo concurrant, colligi excrementa, atque decumbere in aliquam partem, præfens sermo demonstrare studet. Etenim quoad decumbens humor similis fuerit, & capitis dispositio eadem, eousque excrementa æquali colligentur tempore similia & æqualia, & accessiones oculorum similes erunt. Simili modo & si non totius capitis, at certè vnius alicuius in eo partis, aut meningum, aut cerebri ipsius fuerit aliqua dispositio, ita vt ex tali nutrimento colligat tantum taleque excrementum tanto

*Sanguis
excremento-
sus.*

*Excre-
mentum acur-
decum-
bunt in
partes a-
lias.
Oculi ac
aures cir-
cuitione
laboran-
tes.*

tempo-

† ὥστε tempore: deinde expellat excrementum id
 fortasse tunc primum quum ab eo insigniter mo-
 νηται. si. lestatur: accidet & tunc per circuitiōnem
 Pleuri- infestari vel oculos, vel aures, vel ali-
 tis. quid aliud tale, in quod debilius expulsum
 Peripne- fuerit excrementum. † Utigitur in ocu-
 monia. lis, vel auribus, ac pedibus, & alijs mul-
 † Quidā tis partibus talibus perspicuē videtur fie-
 ex codi- ri accessio per circuitiōnem, quemadmo-
 ce greco dum ostensum est: quid mirum in pleu-
 hac ad- ritide, & peripneumonia, & phrenitide,
 dūt, eo- & alijs omnibus quorum non licet intueri
 deq; mō inflammationes, similiter fluere excremen-
 febře ac- tum †: nullo alio ipsa parte inflamma-
 scendere. tione obfessa affectu laborante peculiari ac
 † ἡμίαν proprio ad dictorum generationem, quā
 ὑποδύ- quod mittentibus excrementa eo tempore
 ἡμίαν. i. imbecillior est. Neque etiam illud mirum
 vñ cer- videri debet, quod non † eodem tempore
 to tem- colligantur omnia excrementa. Quod enim
 pore. neque qui defertur ratione alimenti sanguis
 Tempus semper similis est, neque dispositio partium
 collectio quæ aluntur eadem, idcirco aliud alij tem-
 nis excre pus satis est ad tanti excrementi collectio-
 menti. nem. A quo primum natura partis molesta-
 Inequa tur, cogiturque veluti alienum à se id quod
 lium ac molestar, expellere. Neque porrò mirandum
 cessionū est, ipsarum accessionum longitudinem inx-
 causa. qualem esse. cum enim neque genus, ne-
 que

que multitudo excrementorum vnà fit, neque similiter accendi in omnibus, neque difcuti conuenit. Nam plura quidem & frigidiora, & glutinosa, & crassa, longiores committunt accessiones: pauciora autem & calidiora & tenuiora breuiores: con-
 ducente ad id non parum totius corporis constitutione eo tempore & virium robore. Corpus enim rarius breuiores, quantum in se est, efficit accessiones: densius autem longiores. Et robur quidem virium, breuiores: debilitas autem, multò longiores. Facultas enim valida promptius à se expellit id quod est alienum: corporis autem raritas, minimè detinet id quod effer-
 tur. Quocirca ita affectis cito euacuari excrementum necesse est: si etiam alia similia existant. Pari ratione quibus econtrario corpus afficitur, ijs necesse est esse longiorem excretionem excrementorum, debili-
 ter expellente excrementa facultate: detinente autem ea quæ efferuntur, angustia meatuum. Omnibus autem simul concurrentibus, aut breuissima aut longissima accessio fit. Longissima quidem, ob crassitiem, & multitudinem excrementi, ac virium imbecillitatem, meatuumque angustiam: breuissima autem, ob tenuitatem, & paucitatem excrementi, & robur virium, ac viarum am-
 plitudi-

plitudinem.

Quam ob causam accessiones desinant ad integritatem.

CAP. XVII.

*Accessio-
nis ad in-
tegrita-
tem desi-
nētis cau-
sa.*

*Imple-
xus fe-
brilium cau-
sa.*

*Genera-
tionis ex
cremen-
torum du-
plex ra-
tio.*

Simili modo nec quam ob causam accessiones quædam desinant ad integritatem, quædam verò non, difficile est inuenire. Quoties enim prioris accessio-
nis tempus adeò breue fuerit, ut priusquam secunda incipiat, iam prima desierit: medium principij secundæ, priorisque finis interual-
lum totum sine febre existit. Sed ubi secun-
da prius incipiat, quàm prior omnino sol-
uatur, nihil harum medium relinquitur.
Hoc igitur (ut diximus) fit, quum facultas
partis excrementa recipientis sui similis esse
pergit, hoc est, adhuc, ut antea, sanguinem
qui in ipsa habetur, vincit. Quod si quando,
debilis efficiatur, idque ei causa sit cur non
excrementa solùm, sed ipse etiam sanguis
corrumpatur ac putrescat, & febris accenda-
tur: alterum inde quoque initium orietur cir-
cuitu reperentium accessionum. At si quidem
prædictus adhuc seruetur calor, duplex
erit genus febrium inter se implexarum. Si ve-
rò ille quidem desinat, dispositio verò susci-
piantis fluxionem permaneat, quæ demitten-
te sunt dicta prius, de hac intelliges. Hæc
enim pars efficiet in se quædam excrementa
dupli-

duplici ratione, quemadmodum & illa, tum
 quia prauus est sanguis contentus in ea, tum
 quia facultas debilis est. Nec secus si ex qua-
 uis causa reddita sit interdum debilis partis
 dispositio: adeo vt onus ipsi potius quam ali-
 mentum sit sanguis adiectus. Corruptetur *Calid. fa-*
 enim: & si calidus fuerit, facile putrescet. Si *cile cor-*
 vero subfrigidus ac pituitosus, non statim qui- *rumpit.*
 dem: sed processu temporis is quoque can- *Febris ex*
 dem suscipiet dispositionem. Quinetiam *cogestio-*
 ubi nequeat concoquere quælibet pars ge- *ne.*
 nita in se excrementa, aut expellere ad
 aliam, tale sibi ipsi initium febricitandi, qua-
 le ea quæ transmittit alteri, adfert. Cur au-
 tem nequeat alteri mittere excrementa,
 prima quidem causa est in viribus mittentis
 suscipientisque: altera autem in viarum
 obstructione, quæ à glutinosis, crassis, &
 multis fieri solet humoribus. Nihil igitur
 miri est, si etiam absque eo quod altera
 mittat alteri excrementum (quemadmodum
 caput oculis mittebat.) ex excrementis in
 ipsa adhuc manentibus in eandem susci-
 pienti aliena dispositionem deuenierit. Quæ
 enim obstruxerunt naturales effluxus, pro- *Infestio.*
 cessu temporis ea quoque putrescant ne-
 cesse est: & causa sint oportet ob quam
 multitudo excrementorum in parte mi-
 nimè vacuetur, & vt solita erat diffictur.
 Putre-

Excre-
 menta
 cur non
 mittunt.

Putrefa-ctio. Putrescunt igitur ut illa ea quoque quæ post-
ea colliguntur, & omnia simul accendunt sta-
tim in parte caliditatem febrilem. Suprà au-
tem indicauimus ubi accenditur quædam
vel etiam augetur caliditas, in eam partem
ab alijs sanguinem defluere. Itaque necesse
est, ut tempore quo defluit, partes illæ refri-
gerentur sanguine destitutæ: pars autem affe-
Caloris accensio vel augmentum. cta grauetur atque distendatur: & qui deflu-
xit sanguis alteretur, propter duas causas,
& quia putrescentibus iam excrementis per-
miscetur, & quia impactus minimè diffilatur.

Diffusio Analogia. Quocirca succenditur instar lignorum hu-
midiorum confertim in exiguam flammam
conectorum, atque id tempus omne initium
accessionis appellatur. Vbi verò calor su-
Initium accessio- nis quid. perat materiam, appellatur incrementum &
ascensus, tale tempus. Atque eo tempore au-
Incrementum. getur calor tam multus, ut non solum deū-
rat locum ipsum qui veluti † causa quædam
† *isix fo- cus.* putredinis est, sed iam per continuitatem
depascatur vniuersum corpus: & ubi ad sum-
Vigor. mum peruenerunt feruorem qui accendun-
tur humores: appellatur vigor talis pars ac-
cessionis. Vniuersum verò ignitum esse vi-
detur tunc ægroti corpus, calore in vniuerso
animali æqualiter intenso: deinde si quidem
humores tenues sint, ac facultas valida, &
corpus rarum, pars plurima feruifactorum
humo-

humorū fusa in sudorem vacuatur. Quod si *Inclina-*
 erassi fuerint, ac expultrix facultas debilis, & *tio.*
 viæ angustæ, nihil quidem sensibile effluit:
 sed solum id quod ita extenuatum est vt in
 habitus tenuis transierit naturam. appellatur
 autem id tempus inclinatio, quæ perspiratio
 quædam est humorum feruefactorum. Sed
 vbi in parte dispositio permaneat necesse est *Disposi-*
 alterum in ea gigni excrementum: cum quod *tio per-*
 rursus in eam attrahitur alimentum, non pla *manens*
 ne totum vincatur. Quod rursus (vt ante do *in parte*
 cuimus) & ab excrementis putridis in parte *affecta.*
 ipsa relictis, & ab ipsa propria prauitate, ini-
 tium putredinis suscipit: & vbi admodum in-
 caluerit, rursus decumbit in ipsam, vt prius
 dictus ex alijs animalis partibus sanguis, rur-
 susque eodem modo, initium, incrementum,
 vigor & inclinatio accessionis fit. Atque hoc *Sequens*
 certo ambitu tantisper fit, dum affectus in *accessio-*
 parte primum gignente excrementa seruatur. *nis cau-*
sa.

*Quamobrem febres interdum repetant per
 circuitionem, interdum continue sint.*

CAP. XVIII.

AT vero dispositio talis duplex est. *Disposi-*
 altera quidem partis debilitas, per *tio par-*
 quam gignuntur excrementa: alte *tis affe-*
 ra vero ex ipsis quotidie generis *ita du-*
 I colle

plex: de- collecta. Caue enim putes in vasis externis *in-*
bilis et quibus elixa cibaria nidorulenta euaserunt,
excreme dispositionem quandam relinqui: in partibus
ta. autem in quibus humores putrescunt, nullam

Sanatio
febris qñ
subsequi
tur.

Mēstrua

permanere. Quum sanè hæc affectio ægrè
 soluatur, quoties vniuersum corpus malis hu-
 moribus abundet, ac plethoricum sit, multo-
 que ægrius, quoties in his fuerit angustia o-
 mnium meatuum partis excrementa educen-
 tium. quemadmodum & sanatio subsequetur,
 si & meatus expurgentur, vt partis mea-
 tus fluxiles sint, & vires roborentur, & dispo-
 sitio corrigatur: & vniuersum corpus neque
 malis humoribus scateat, neque plethoricum
 sit. Quamdiu autem hæc permanent, circui-
 tionem accessionum permanere necesse est:
 Similiter accidit in mulieribus. In eis enim
 quoad similis causa & æqualis permaneat
 menstruorum, eadem eorum circuitio reti-
 netur. Sed de his omnibus in libro de rheu-
 maticis dispositionibus latiùs docuimus: &
 nunc immorari diutiùs in confirmandis ijs
 quæ ante demonstrata sunt, minimè conue-
 nit: neque præterire capita rerum in præsens
 viliū. Maximè autem vtile est cognoscere,
 quòd aliquæ partes alijs transmittunt fluxio-
 nes, quemadmodum caput oculis: quædam
 verò ab excrementis in se genitis initium fe-
 bricitandi suscipiunt: & quòd his omnibus
 com-

commune excrementorum putredo est. Proprium verò singulis, huic quidem infarctio ac stipatio vasorum, aut ex humore glutinoso, vel crasso, vel multo: alteri verò angustia meatuum vel sensibilem, vel minimè sensibilem: alij autem q̃ omnia spacia vacua in toto ipsius corpore sunt oppleta, & ab his plenitudo ad vires: quemadmodum in libro de plenitudine docuimus. Febriū igitur circuitione repetentium haud scio an vlla generationis causa omissa sit. Earū autem quæ ordine carent, nonnullæ ob humoris mutationem, nonnullæ ob rationis vicius errorē, ad eiusmodi constitutionem deueniunt. Sanguis igitur putrescens maximè mutatur, quoniam (vt ante diximus) partim flaua bilis, partim atra efficitur. Quantum igitur humores in corpore ægro mutantur, tantum & circuitiones accessionum. Quocirca minimè mirum videri debet, per tales mutationes ordinem quoque mutari. Mutantur verò maximè, vbi qui incepit putrescere, in aliqua parte alius existit, alius autem ex alijs defluit; qui aut in illis solis talis habebatur, aut in toto animalis corpore exuperabat. Nec secus quæcunque ægri in vicius ratione delinquant, hæc quoque nihilò minùs corrumpunt circuitionis ordinem. Vt enim in sanis prauus vicius morborum causa est: eodem modo vel

magis etiam in agris, ex ijs quæ deliquerint, accessiones inordinatæ existunt. Nec solum adhuc ægrotantes, sed etiam quo tempore à morbis se recolligunt, promptè ex quouis delicto læduntur. Quocirca per omnem insignem læsionem vel præuenire multum circuitiones cogunt, aut diuersi generis à prioribus quasdam gignunt, à quibus accessio-num ordo corrumpitur. Sæpe verò ob implexionem circuitionem incognitam medicis, ægri visi sunt pati inordinatas accessiones. Sed tales ordinum permutationes reuerà non sunt: sed tantummodo videntur. Quæcunque autem reuera sunt, aut ob permutationem humorum committentium febres, aut ob errorem in victus ratione efficiuntur. Reliquum porro synchorum genus (quarum totum tempus vna accessio est, aut semper equalis, aut decrescens, aut increscens vsque ad iudicium) ex tali causa fieri solet, qualem omnium febrium Praxagoras statuit, humorum in caua vena putredinem esse existimans. sed absolutior sermo ac verior hoc modo euadet. Quicunque circuitionibus quibusdam repetunt morbi, partium superueniunt dispositionibus, vel mittentium, vel suscipientium, vel gignentium, vel trahentium excrementa, eo quo paulo supra diximus modo. Qui verò sine circuitione fatigant,

Humorum per mutatio Error in victus ratione. Febris æqualiter affligentis incrementis & decrementis causa. Morborum circuitio ne & sine circuitione instantium discriminē

tigant, in his nullus locus peculiaris affectus
 est: sed humores in venis & arterijs omni-
 bus, maximè que qui in maximis & calidissi-
 mis sunt, aut ob aliquam aliam causam, vt
 in diarijs, aut etiam ob putredinem ferue-
 facti, accendunt febrem vnam continuam,
 ab initio vsque ad finem minimè intermit-
 tentem, eatenus durantem, ac deuren-
 tem hominem, quoad gignentes
 eam humores sint consum-
 pti, aut concocti, aut
 vtrunque
 passi.

SECVNDI ET VLTIMI
 LIBRI GALENI DE DIS-
 ferentijs febrium
 finis.

L V G D V N I,
Excudebant Stephanus Rufi-
nus, & Ioannes Au-
sultus.